



Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Số: KNHV-42/CL/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần qua

b) Diễn biến lượng mưa tuần qua

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa tuần (từ ngày 09-15/10/2026)

Trong tuần từ ngày 09-15/10/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 83,4%; tích ôn hữu hiệu tuần 135,4°C; lượng bốc thoát hơi tiềm năng 22,0mm; lượng mưa hữu hiệu 19,0mm. Trong tuần qua, thời tiết khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 25,1-33,0°C; tổng lượng mưa ở mức 16,1-79,3mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 09-15/10/2026)


Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	82,5	84,0	83,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	58,1	77,3	135,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,4	12,6	22,0
Mưa hữu hiệu (mm)	3,0	16,0	19,0

Các diện tích lúa vụ Thu Đông trên khu vực chủ yếu ở giai đoạn đẻ nhánh rộ – cuối đẻ nhánh – đứng cái – phân hóa đòng. Thời tiết tuần qua có mưa vừa và dông vài nơi, tổng lượng mưa đạt 16–79mm, mưa có xu thế giảm so với tuần trước, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nước cho lúa sinh trưởng. Tuy nhiên, mưa kéo dài


trong nhiều ngày, lượng nước dư thừa trong đất khá cao, gây khó khăn cho việc rút nước ở những diện tích lúa cuối đẻ nhánh, làm gia tăng tỷ lệ nhánh vô hiệu. Đồng thời, mưa kết hợp triều cường tăng đã làm ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông rạch. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại, đáng chú ý gồm: bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, sọc trong, vàng lá do vi khuẩn, sâu cuốn lá, sâu đục thân,...

Cây xoài trên khu vực chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Thời tiết tuần qua, nhiều ngày có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt khoảng 22mm. Mưa kéo dài làm gia tăng độ ẩm đất, gây khó khăn cho công tác chăm sóc và phục hồi sinh trưởng của cây, đồng thời làm giảm độ thông thoáng của đất, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và hoạt động hấp thu dinh dưỡng của bộ rễ, cây sinh trưởng kém hơn. Tuần qua, điều kiện thời tiết ẩm ướt, mưa trong nhiều ngày tạo thuận lợi cho các loại nấm và vi khuẩn phát sinh, gây hại trên cây xoài, phổ biến như bệnh xì mũ thân, thối rễ, thán thư, đốm lá,...


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 50 - 53°C, tích ôn hữu hiệu dự báo trong 04 ngày sau dao động trong khoảng 65 - 72°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại tất cả các tỉnh trên khu vực có xu thế thấp hơn từ 5-22°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo trong 03 ngày đầu ở mức 9 - 25mm, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 12mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại các tỉnh Cà Mau, An Giang, phía Tây tỉnh Đồng Tháp, rìa phía Tây Bắc tp. Cần Thơ, rìa phía Tây Nam tỉnh Tây Ninh, rìa phía Đông của các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long có xu thế lớn hơn, dao động trong khoảng từ 3,2-16mm; Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ ở mức 3,2-16mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 21-22mm. So với cùng kỳ năm trước, lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại tỉnh An Giang, phía Tây của các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, rìa phía Bắc của tp. Cần Thơ, rìa Tây Nam của tỉnh Tây Ninh có xu thế cao hơn, dao động trong khoảng 0,01-0,35mm; Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ ở mức 0,16-0,5mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 99-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết cả các tỉnh trên khu vực có xu thế lớn hơn, trong khoảng từ 1,5-9,5%; Chỉ ngoại trừ rìa phía Tây của các tỉnh An Giang, Cà Mau có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ ở mức 0,5%.

Tính trung bình, trên toàn khu vực đang trong giai rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 86 - 95%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	86,7-94,3	86,0-96,0	86,3-95,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	49,5-53,3	65,1-72,4	114,6-125,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,1-9,3	12,0-12,3	21,1-21,6
Mưa hữu hiệu (mm)	9,1-24,6	12,0-12,3	21,1-36,8
Cân bằng nước trong đất (%)	98,5-100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 16-22/10/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ không khí dự báo dao động trong khoảng 24-31°C, tổng lượng mưa dự báo dao động khoảng 75-154mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Các diện tích lúa vụ Thu Đông trên khu vực tập trung chủ yếu ở các giai đoạn cuối đẻ nhánh – đứng cái – làm đòng. Dự báo tuần tới, các tỉnh trong khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng mưa tuần dao động trong khoảng 75–154mm; cân bằng nước trong đất duy trì ở mức cao 99–100%, dự thừa nước trong đất sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, đổ ngã lúa. Do đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra, gia cố bờ bao, hạn chế nước thấm hoặc chảy tràn vào ruộng, đồng thời chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn, không để lúa bị ngập úng kéo dài, chỉ duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm đối với diện tích lúa ở giai đoạn đứng cái – làm đòng, bảo đảm đủ nước cho quá trình sinh trưởng và phát triển của đòng; đồng thời bón thúc đón đòng kịp thời, bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng, đặc biệt là kẽm,

nhằm duy trì bộ lá đồng xanh khỏe, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển đồng; đối với diện tích lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, cần rút cạn nước trong ruộng khoảng 7–10 ngày nhằm hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, kích thích bộ rễ phát triển ăn sâu, giúp ruộng thông thoáng, tăng khả năng quang hợp và tích lũy chất hữu cơ, góp phần làm cây lúa cứng chắc, hạn chế đổ ngã. Điều kiện thời tiết tuần tới ẩm ướt sẽ tạo thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh và gia tăng gây hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, sọc trong, đốm vằn, bọ xít hôi,... Vì vậy, người dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời. Đối với bệnh đạo ôn lá, cần tạm ngừng bón phân, đặc biệt là phân đạm và phân bón lá có nguy cơ làm bệnh phát triển mạnh, cho đến khi bệnh được kiểm soát. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, lựa chọn thời điểm phun phù hợp và sử dụng chất bám dính theo khuyến cáo để hạn chế thuốc bị rửa trôi khi gặp mưa. Bên cạnh đó, cần chú ý kiểm tra mép ruộng, bờ cỏ và những khu vực lúa trở bông sớm để phát hiện bọ xít hôi, từ đó có biện pháp quản lý kịp thời, hạn chế thiệt hại và bảo đảm cây lúa sinh trưởng ổn định trong các giai đoạn tiếp theo.


Cây xoài trên khu vực tiếp tục trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch; độ ẩm đất thích hợp cho cây sinh trưởng trong giai đoạn này khoảng 70–75%. Dự báo tuần tới, khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động 21–37mm; cân bằng nước trong đất duy trì ở mức cao 99–100%, lượng nước tích lũy trong đất khá cao, gia tăng nguy cơ ngâ úng vườn khi có mưa, cây xoài dễ thiếu oxy vùng rễ, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và phục hồi sinh trưởng sau thu hoạch. Do đó, người dân cần chủ động nạo vét mương rãnh, khơi thông hệ thống thoát nước, đào rãnh phụ quanh gốc và gia cố bờ bao; chuẩn bị máy bơm để tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn, không để nước đọng lâu ngày trong vườn. Sau mưa, hạn chế đi lại trên nền đất còn ướt để tránh làm nén chặt đất, tổn thương rễ; khi đất ráo, có thể xới nhẹ lớp đất mặt quanh gốc để tăng độ thông thoáng, kết hợp vệ sinh vườn, thu gom cành lá rụng và tàn dư thực vật nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh tồn lưu. Trong những ngày nắng ráo, cần cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, cành vô hiệu và cành mọc dày trong tán, tạo độ thông thoáng, giúp cây tập trung dinh dưỡng phát triển chồi mới và hình thành cành mang quả cho vụ sau; dụng cụ cắt tỉa cần được vệ sinh, khử trùng, vết cắt lớn cần được xử lý phù hợp để hạn chế nấm bệnh xâm nhập. Về dinh dưỡng, chỉ bón phân khi đất đã thoát nước, khô ráo, không bón

khi đất còn quá ẩm hoặc có nguy cơ ngập úng; ưu tiên phân hữu cơ hoai mục kết hợp phân NPK cân đối, chia thành nhiều lần bón phù hợp với sức sinh trưởng của cây, có thể bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng như Canxi, Bo, Kẽm để hỗ trợ phát triển bộ lá và tăng sức chống chịu; hạn chế bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết ẩm ướt vì có thể kích thích chồi non phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Thời tiết tuần tới tiếp tục có mưa, độ ẩm cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nứt thân xì mũ, thán thư, thối rễ, đốm rong,... phát sinh và gây hại. Vì vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn, chú ý vùng gốc, thân, cành và bộ lá để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh; đối với cây bị bệnh, cần cắt bỏ, thu gom và tiêu hủy bộ phận nhiễm bệnh, vệ sinh dụng cụ sau khi xử lý; đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc chế phẩm sinh học, tránh xử lý lúc đất đang úng nước; phun thuốc đặc trị nấm định kỳ 15-25 ngày/lần, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” để bảo vệ cây trồng, giúp cây phục hồi sinh trưởng và chuẩn bị tốt cho vụ tiếp theo.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 23/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng