


Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV- 42/DN/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 09-15/10/2026)

Trong tuần từ ngày 09-15/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 81,3%; tích ôn hữu hiệu tuần đạt 133,8°C; bốc thoát hơi tiềm năng đạt 21,7mm; lượng mưa hữu hiệu đạt 18,5mm. Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ không khí dao động từ 23,6-33,9°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 5,2-158,5mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 09-15/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	81,2	81,5	81,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	56,7	77,1	133,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,3	12,4	21,7
Mưa hữu hiệu (mm)	5	13,5	18,5

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây cà phê chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Thời tiết tuần qua, khu vực có mưa dông trên diện rộng; nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to, với tổng lượng mưa đo được dao động trong khoảng 5-159mm. Mưa kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao, đặc biệt trong


khoảng ngày 11/10 đến ngày 13/10, khi đỉnh triều trùng với thời điểm mưa lớn, nước rút chậm, gây ngập úng tại nhiều vùng trũng thấp, ven sông Sài Gòn và vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Tình trạng dư thừa nước, ngập úng kéo dài tại một số vườn cà phê đã làm bộ rễ thiếu oxy, cây vàng lá, rụng quả; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát sinh và gia tăng gây hại. Thời tiết tuần qua mưa nhiều, độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh, gây hại trên cây cà phê như: bệnh thán thư, nấm hồng, gỉ sắt, bọ trĩ và rệp sáp... gây hại rải rác, cục bộ hại nặng.

Cây cao su trên khu vực Đông Nam Bộ chủ yếu đang trong giai đoạn khai thác mủ. Thời tiết tuần qua khu vực có mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt 19mm, đã ảnh hưởng đến tiến độ khai thác mủ cao su và chất lượng mủ trên khu vực. Mưa kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao, đạt đỉnh trong khoảng ngày 11/10 đến ngày 13/10, gây ngập úng cục bộ tại một số vườn cao su ở vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch và những nơi thoát nước kém gây dư thừa nước trong đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh, gây hại. Thời tiết tuần qua mưa nhiều, độ ẩm không khí cao đã thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây cao su như: bệnh nấm hồng, bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo, bệnh đốm lá, thối rễ...

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 50-53°C, 04 ngày cuối tuần dao động khoảng 66-71°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1-26°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 9-46mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 12-14mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 2,4-36mm. Riêng

tại phía Bắc TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3-6mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động xung quanh 21mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0-0,7mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo dao động trong khoảng 94-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,6-6,2%.

Tính trung bình, trên toàn khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 90-95%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	90,0-94,3	89,3-95,5	89,6-95,0
Tích ôn hữu hiệu (°C)	49,7-52,7	65,5-70,8	115,2-123,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,2-9,2	12,1-12,2	21,3-21,4
Mưa hữu hiệu (mm)	9,2-45,8	12,1-14,2	21,3-60,0
Cân bằng nước trong đất (%)	93,9-100		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 16-22/10/2026, khu vực Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 24,0-31,5°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 75,3-97,3mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây cà phê tiếp tục giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Nhiệt độ thích hợp cho cà phê sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24-25°C, độ ẩm đất thích hợp trong khoảng 70-75%. Dự báo tuần tới, do nhiều động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, khu vực tiếp tục có mưa trên diện rộng, tổng lượng mưa hữu hiệu khoảng 21-60mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 94-100%, gây dư thừa nước, gia tăng nguy cơ ngập úng khi có mưa to. Bên cạnh đó, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai tiếp tục ở mức khá cao, gây nguy cơ gây ngập tại các vùng trũng thấp ven sông

Đồng Nai, sông La Ngà và các khu vực ven suối. Các vùng dọc sông Sài Gòn, hạ du hồ Dầu Tiếng và ven sông Thị Tính cũng cần chủ động đề phòng ngập lụt. Vì vậy, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn, khơi thông mương rãnh, chủ động tiêu thoát nước cho vườn sau mưa lớn, không để nước đọng kéo dài, đặc biệt tại những vùng thấp trũng, thoát nước kém. Đối với vườn ca phê hiện nay đang bị ngập úng, cần khẩn trương bơm tiêu nước, hạn chế đi lại để tránh làm đất nén chặt, gây tổn thương bộ rễ. Sau khi đất se khô, có thể xới nhẹ lớp đất mặt tại những vị trí bị đóng váng nhằm tăng độ thông thoáng, hỗ trợ bộ rễ phục hồi và nâng cao khả năng hấp thu dinh dưỡng. Trong giai đoạn này, cần cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chú trọng bổ sung kali nhằm thúc đẩy quá trình tích lũy chất khô, phát triển nhân và nâng cao chất lượng hạt; kết hợp bổ sung canxi, magie và bo để tăng cường khả năng vận chuyển và tích lũy dinh dưỡng, góp phần hạn chế rụng quả; chia thành nhiều đợt bón, bón khi đất đủ ẩm và cây đang sinh trưởng ổn định; không bón phân khi trời mưa lớn hoặc đất đang bão hòa nước nhằm hạn chế rửa trôi, thất thoát dinh dưỡng và ảnh hưởng bất lợi đến bộ rễ. Những vườn cây sinh trưởng yếu, bộ rễ bị ảnh hưởng do úng nước cần ưu tiên phục hồi bộ rễ trước khi tăng lượng phân bón. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh và gây hại như: bệnh nấm hồng, bệnh gỉ sắt, rệp sáp, thối rễ, lở cổ rễ.... Vì vậy, người dân cần thường xuyên thăm vườn, kiểm tra thân, cành, lá và quả để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại, đặc biệt tại những khu vực có tán cây rậm rạp, độ ẩm cao, thoát nước kém hoặc cây sinh trưởng yếu. Tranh thủ những ngày thời tiết khô ráo để tỉa bỏ cành khô, cành sâu bệnh, vệ sinh vườn và duy trì độ thông thoáng của tán cây, góp phần hạn chế nguồn bệnh và giảm nguy cơ lây lan. Khi phát hiện sâu bệnh, cần khoanh vùng, xác định đúng đối tượng gây hại và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp; ưu tiên các biện pháp canh tác, sinh học, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Hạn chế phun thuốc tràn lan trên toàn vườn nhằm bảo vệ thiên địch, giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động đến môi trường.

Cây cao su trên khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; người dân cần tranh thủ khai thác mủ vào buổi sáng sớm, khi thời tiết tạnh ráo, tránh ảnh hưởng đến chất lượng mủ bởi mưa. Nhiệt độ thích hợp cho cây cao su sinh trưởng và phát triển từ 20°C đến 32°C (tốt nhất ở 26°C đến 28°C), độ ẩm đất thích hợp trong khoảng 70-85%. Dự

báo tuần tới, nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24-32°C, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 21-60mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 94-100%. Qua đó có thể thấy, nhiệt độ không khí về cơ bản thuận lợi cho cây cao su sinh trưởng và phát triển trong tuần tới, lượng mưa và cân bằng nước trong đất cao hơn rất nhiều so với độ ẩm đất thích hợp cho cây cao su, gây dư thừa nước trong đất. Đồng thời, mực nước trên sông Đồng Nai đang ở mức khá cao, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp. Do đó, cần chủ động kiểm tra, khơi thông và nạo vét hệ thống mương rãnh, tuyến thoát nước; tiêu thoát nước kịp thời sau mưa, không để nước đọng kéo dài trong vườn gia tăng nấm bệnh gây hại trên cao su, nhất là tại các khu vực thấp trũng, thoát nước kém. Sau mưa lớn kèm gió mạnh, cần kiểm tra vườn, dựng lại và cố định các cây bị nghiêng, xử lý cành gãy, đổ; vệ sinh các vết tổn thương tránh để nấm bệnh xâm nhập. Đối với những diện tích đã bị ngập từ tuần trước, cần tích cực thoát nước và theo dõi tình trạng phục hồi của cây, kiểm tra vùng gốc, thân và miệng cạo; hạn chế đi lại, đồng thời phát hiện sớm các biểu hiện vàng lá, suy giảm sinh trưởng, thối rễ và bệnh xì mủ để xử lý kịp thời. Thời tiết tuần tới mưa nhiều, độ ẩm cao thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh khô miệng cạo, loét sọc miệng cạo, nấm hồng và hiện tượng nứt thân xì mủ.... Cần thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện bệnh để xử lý kịp thời, hạn chế bệnh phát triển và lây lan. Đồng thời, theo dõi các biểu hiện vàng lá, suy giảm sinh trưởng để có biện pháp chăm sóc, phục hồi phù hợp, góp phần duy trì sức khỏe cây và năng suất khai thác mủ ổn định.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 23/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng