


Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV- 40/DN/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 25/09-01/10/2026)

Trong tuần từ ngày 25/09-01/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 79,4%; tích ôn hữu hiệu tuần đạt 133,8°C; bốc thoát hơi tiềm năng đạt 22,4mm; lượng mưa hữu hiệu đạt 21mm. Tuần qua, từ ngày 25-27/9, khu vực Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, đến ngày 30/9 có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ không khí dao động từ 23,6-34,5°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 18-317,5mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 25/09-01/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	81,9	77,5	79,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	54,9	78,9	133,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,6	12,7	22,4
Mưa hữu hiệu (mm)	9,7	11,3	21

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây điều chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - ra đợt non. Tuần qua, khu vực có mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung cao điểm vào các ngày 26-27/9 và ngày 30/9), với tổng lượng mưa đo


được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động khoảng 18-318mm. Đáng chú ý, lượng mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường đã gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đất bão hòa nước dẫn đến suy giảm oxy vùng rễ; hạn chế khả năng hô hấp, hấp thu nước, dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và ra đọt non trên điều. Thời tiết tuần qua mưa nhiều, độ ẩm cao đã thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh thán thư, nấm hồng và các bệnh gây thối rễ, cổ rễ; sâu ăn lá, bọ xít muỗi và một số côn trùng gây hại trên đọt non.

Cây cà phê trên khu vực Đông Nam Bộ chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Thời tiết khu vực tuần qua có mưa diện rộng, cục bộ có nơi to đến rất to, với lượng mưa hữu hiệu đạt 21mm, đã bổ sung được lượng nước cần thiết cho cây cà phê sinh trưởng. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài vào các ngày 26-27/9 và ngày 30/9 kết hợp với triều cường đã gây ngập úng cục bộ tại một số vườn cà phê, làm bộ rễ thiếu oxy, cây vàng lá, rụng quả; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát sinh và gây hại. Thời tiết tuần qua mưa nhiều, độ ẩm không khí cao đã tạo môi trường thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây cà phê như: nấm hồng, thán thư, thối rễ – cổ rễ, gỉ sắt, bọ trĩ, rệp sáp,...gây hại rải rác, cục bộ hại nặng.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 51-54°C, 04 ngày cuối dao động khoảng 67-70°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3-20°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 10-15mm, 04 ngày cuối tuần dao động xung quanh 13mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,2-17mm. Riêng

một phần tại phía Bắc TP. Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,2-4mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động xung quanh 22mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,08-0,6mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo lên tới 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1-7,5%.

Tính trung bình, trên toàn khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 89-92%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	88,7-91,7	88,5-91,8	88,6-91,7
Tích ôn hữu hiệu (°C)	51,3-54,0	67,1-70,4	118,4-124,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,6-9,7	12,6-12,7	22,2-22,3
Mưa hữu hiệu (mm)	9,6-14,9	12,5-12,7	22,2-27,6
Cân bằng nước trong đất (%)	100		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 02-08/10/2026, khu vực Đông Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 23,8-31,3°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 68,7-89,3mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây điều chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - ra đọt non, một số diện tích bắt đầu phân hóa mầm hoa. Nhiệt độ thích hợp cho cây điều sinh trưởng và phát triển dao động khoảng 18-38°C, độ ẩm đất khoảng 65-75%. Dự báo tuần tới, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 22-28mm, cân bằng nước trong đất trên toàn khu vực có thể lên đến 100%, gây dư thừa nước trong đất. Đồng thời, mưa lớn kết hợp mực nước sông dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối (đặc biệt tại các

khu vực như xã Phước Tân, Long Hưng, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Phước An thuộc tp. Đồng Nai và những vùng thấp ven sông Đồng Nai được cảnh báo nguy cơ ngập nặng). Ngập úng làm đất bão hòa nước, giảm oxy vùng rễ, ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và hấp thu dinh dưỡng của cây; nếu kéo dài có thể làm tổn thương rễ, thối rễ, làm cho cây sinh trưởng chậm và đợt non phát triển kém. Do đó, người dân cần chú ý khơi thông mương, rãnh, chủ động tiêu thoát nước cho vườn khi có mưa to; tích cực thoát nước cho các vườn đang bị ngập, không để vườn ngập úng kéo dài gây tổn thương bộ rễ. Sau khi đất khô ráo và cây bắt đầu phục hồi, tiến hành bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp NPK cân đối, để thúc đẩy ra đợt và phục hồi cây; không bón phân khi có mưa lớn để tránh thất thoát dinh dưỡng. Khi trời tạnh ráo, cắt tỉa cành khô, gãy, sâu bệnh, cành vượt và cành nằm trong tán để tạo độ thông thoáng. Thời tiết tuần tới mưa nhiều, ẩm độ cao thuận lợi cho các bệnh phát sinh gây hại như: thán thư, cháy lá, khô cành, nấm hồng, thối rễ – cổ rễ, rệp muội và bọ xít muỗi...gia tăng gây hại, người dân cần thường xuyên kiểm tra đợt non, lá, cành và vùng cổ rễ, nhất là các vườn bị ngập, để phát hiện sớm sâu bệnh; cắt bỏ, thu gom và tiêu hủy bộ phận bị bệnh, vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng và hạn chế để vườn ẩm ướt kéo dài.


Cây cà phê trên khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Nhiệt độ thích hợp cho cà phê sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24-25°C, độ ẩm đất thích hợp trong khoảng 70-75%. Dự báo tuần tới, khu vực tiếp tục có mưa trên diện rộng, tổng lượng mưa hữu hiệu khoảng 22-28mm, cân bằng nước trong đất có thể lên tới 100%, gây dư thừa nước, gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vườn trũng thấp. Đồng thời, mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối. Do đó, người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mưa và triều cường, và cảnh báo ngập lụt; chủ động khơi thông mương rãnh, chủ động tiêu thoát nước cho vườn ngay sau các đợt mưa lớn, không để nước đọng lâu trong vườn, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, thoát nước kém. Đối với những vườn đang ngập úng, cần tích cực bơm tiêu rút nước; hạn chế đi lại khi đất còn quá ướt nhằm tránh làm đất bị nén chặt, ảnh hưởng đến bộ rễ. Sau khi đất se khô, có thể xới nhẹ lớp đất mặt ở những vị trí bị đóng váng để tăng độ thông thoáng, tạo điều kiện cho rễ phục hồi và hấp thu dinh dưỡng. Trong giai đoạn này, cần bón phân, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đặc biệt chú trọng kali, canxi, magie và bo nhằm hỗ trợ quá trình phát triển quả, hạn chế rụng quả non và nâng cao chất lượng hạt, chú ý không bón phân khi trời mưa to; chia lượng phân thành nhiều lần bón, bón

khi đất đủ ẩm và cây đang sinh trưởng ổn định; không bón phân khi đất đang úng hoặc quá ẩm để hạn chế thất thoát dinh dưỡng và tránh gây tổn thương bộ rễ. Những vườn cây sinh trưởng yếu, bộ rễ bị ảnh hưởng do úng nước cần ưu tiên phục hồi bộ rễ trước khi tăng lượng phân bón. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh và gây hại như: rệp sáp, bệnh nấm hồng, bệnh gỉ sắt.... Vì vậy, cần thường xuyên kiểm tra vườn, chú ý các vị trí tán cây rậm, vườn ẩm thấp và những cây sinh trưởng yếu để phát hiện sớm; ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp, vệ sinh vườn và khoanh vùng xử lý những cây hoặc khu vực bị nhiễm, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết; hạn chế phun thuốc tràn lan toàn vườn nhằm bảo vệ thiên địch, giảm chi phí sản xuất và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 09/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng