


Số: KNHV-41/BT/KSCD


Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 02-08/10/2026)

Trong tuần từ ngày 02-08/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 80,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 125,7°C; bốc thoát hơi tiềm năng 20,2mm; lượng mưa hữu hiệu 31,0mm. Từ ngày 02-03/10, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 04/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc khu vực từ khoảng ngày 06/10, phía Bắc có mưa rào vài rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 23,7-31,4°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 22,3-316,8mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02-08/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	80,5	79,9	80,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	61,4	64,3	125,7
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,1	11,1	20,2
Mưa hữu hiệu (mm)	4,4	26,6	31,0

Các diện tích sản trên khu vực trong giai đoạn phát triển củ - tích lũy tinh bột. Tuần qua, trong khoảng 2 ngày đầu tuần, trên khu vực duy trì thời tiết nắng


ráo, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, cơ bản thuận lợi cho công tác chăm sóc và thu hoạch các các diện tích sản củ. Từ khoảng ngày 04/10, trên khu vực đã xảy ra mưa lớn diện rộng (phía Nam khu vực có mưa lớn diện rộng đến hết tuần; phía Bắc khu vực mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 05/10) đã gây ra tình trạng ngập úng, dư thừa nước tại nhiều nơi, gây khó khăn cho công tác thu hoạch và làm tăng nguy cơ thối củ sản. Trong tuần, sâu bệnh hại trên cây sản chủ yếu là bệnh khảm lá sản do virus.

Rau màu vụ Đông trong các giai đoạn sinh trưởng. Tuần qua, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 04/10 trên khu vực có mưa trên diện rộng, nhiều địa phương đã có mưa rất to (Hà Tĩnh, Tp. Huế, Nghệ An), đã gây ra tình trạng bão hoà ẩm trong đất, nhiều vùng trũng thấp đã xảy ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng đến tiến độ xuống giống gieo trồng rau màu vụ Đông, gây khó khăn cho công tác thu hoạch, đồng thời, làm tăng nguy cơ thiệt hại rau màu trên những diện tích bị ngập úng kéo dài. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm ở mức cao kèm theo nền nhiệt độ ở mức thấp đã tạo môi trường thuận lợi cho các loại nấm bệnh hại phát triển (bệnh thối nhũn, thối thân, thối bẹ, bệnh sương mai, thán thư, lở cổ rễ ...) gây hại trên rau màu.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước


Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước


Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 41-56°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 58-76°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-23°C; riêng một phần rất nhỏ phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 5°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 9-19mm; trong 4 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong

khoảng 2-12mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 2-25mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 19-21mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế tương đương đến thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-0,7mm; riêng một phần nhỏ phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 0,2mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 96-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất từ tại tỉnh Thanh Hoá và phần lớn tỉnh Nghệ An có xu thế thấp hơn cùng kỳ khoảng 1%; các vùng còn lại xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-3%.

Tính trung bình, khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 83-96%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	82,7-98,0	84,0-94,8	83,4-96,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	41,0-55,6	58,0-75,7	99,0-131,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,2-8,9	10,9-11,6	19,1-20,5
Mưa hữu hiệu (mm)	8,5-19,2	2,1-11,7	15,3-27,1
Cân bằng nước trong đất (%)	95,6-99,9		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ đêm 09/10 đến ngày 10/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa to đến rất to. Từ đêm 10/10, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng (riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị từ đêm 10-11/10 có mưa rào và dông rải rác); Từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; Từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 22-32°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 60-141mm. (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Cây sắn trong giai đoạn tích lũy tinh bột; những diện tích sắn trồng sớm trong giai đoạn thu hoạch. Tuần tới, dự báo khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 09-10/10 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to đến hết ngày 11/10. Tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 60-141mm, cân bằng nước trong đất dao động từ 96-100%. Trong điều kiện thời tiết tuần tới có mưa to tập trung trong những ngày đầu tuần, sẽ gia tăng nguy cơ dư thừa ẩm trong đất, ngập úng tại những vùng trũng thấp, khả năng thoát nước kém, và làm gia tăng nguy cơ thối củ và ảnh hưởng tiến độ thu hoạch sắn ở nhiều nơi; các đối tượng nấm bệnh hại cũng sẽ có điều kiện để phát triển và gia tăng mức độ gây hại. Do đó, ngay sau khi đợt mưa lớn diện rộng, từ khoảng ngày 11/10 đến cuối tuần, cần tập trung khơi thông mương rãnh, tích cực tiêu thoát nước tại những chân ruộng đang bị ngập úng; song song với đó, khẩn trương thu hoạch các diện tích sắn củ đã già, tránh để củ sắn bị ngập úng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ thiệt hại. Tuần tới, thời tiết mưa ẩm, bệnh khảm lá sắn, bệnh thối củ có khả năng tiếp tục gây hại trên nhiều vùng trồng sắn trên khu vực.


Rau màu trên khu vực trong giai đoạn gieo trồng - thu hoạch. Tuần tới, dự báo khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 11/10 mưa có xu thế giảm dần (từ khoảng ngày 12/10 đối với Nam Quảng Trị đến Tp. Huế); tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 60-141mm (trong đó tổng lượng mưa hữu hiệu dao động từ 15-27mm), cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 96-100%. Có thể nhận thấy, đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tuần sẽ ảnh hưởng đến công tác xuống giống gieo trồng và thu hoạch các diện tích rau màu; đồng thời, mưa lớn kèm theo dông sẽ gia tăng tình trạng ngập úng, đổ ngã, dập nát, thiệt hại đến nhiều diện tích rau trên khu vực. Do đó, đối với công tác xuống giống gieo trồng, cần hạn chế thực hiện trong tuần tới (đặc biệt là thời kỳ những ngày đầu tuần); đối với công tác thu hoạch rau màu, tranh thủ những khoảng thời gian mưa giảm, người dân cần tập trung thu hoạch toàn bộ nhằm chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cần tích cực khơi thông mương rãnh, xẻ thêm nhiều đường thoát nước trong ruộng, thực hiện các biện pháp che chắn (đặc biệt là với rau ăn lá) và gia cố giàn đối với những loại rau thân leo giàn (bí xanh, mướp, su su, dưa chuột, ...) để hạn chế thiệt hại do mưa lớn; kịp thời tiêu thoát nước cho đồng

ruộng khi có mưa to;, sau khi bề mặt đất bắt đầu khô se trở lại cần nhanh chóng xới phá váng, làm cỏ kết hợp bấm ngọn/tỉa cành để giúp tán cây và bề mặt đất thông thoáng khí, giảm độ ẩm trong đất, hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ và cỏ dại cạnh tranh với cây rau. Trong tuần tới, các đối tượng như: sâu ăn lá, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh sương mai, bệnh đốm lá ... có khả năng tiếp tục gây hại trong điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng