



*Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

Số: KNHV-41/TD/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC  
THỜI HẠN TUẦN  
(Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)**

## 1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) *Diễn biến nhiệt độ tuần*

b) *Diễn biến lương mưa tuần*

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 02-08/10/2026)

Trong tuần từ ngày 02-08/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trên khu vực 72,5%; tích ôn hữu hiệu tuần 118,1°C; bốc thoát hơi tiềm năng 18,8mm; lượng mưa hữu hiệu 25,7mm. Trong tuần, khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 04-05/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 18,4-31,9°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 0,2-176,0mm.

Tuần qua, ngày 04/10, mưa lớn, dông, sét xảy ra trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La đã gây thiệt hại 03 ha lúa, hoa màu tại Điện Biên (*nguồn: Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai*).


*Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02-08/10/2026)*

| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 79,7       | 67,1        | 72,5       |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 57,6       | 60,4        | 118,1      |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 8,6        | 10,2        | 18,8       |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 13,0       | 12,7        | 25,7       |


Lúa vụ Mùa trong giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh - chín - thu hoạch. Tuần qua, hầu hết các ngày trong tuần, trên khu vực duy trì thời tiết ngày nắng ráo, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa vụ Mùa đã chín. Riêng thời kỳ từ khoảng ngày 04-05/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to đã ảnh hưởng đến công tác thu hoạch và bảo quản lúa. Đồng thời, một số nơi mưa đông đã gây thiệt hại cho một số diện tích lúa; trong đó, đáng chú ý là tỉnh Điện Biên với khoảng 03 ha lúa, hoa màu đã bị thiệt hại do đợt mưa đông trong ngày 04/10 gây ra. Tuần qua, sâu bệnh hại trên cây lúa chủ yếu là các đối tượng như: sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt.

Cây ngô vụ Đông trong giai đoạn gieo trồng - mọc mầm - cây con. Tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 04-05/10, trên khu vực đã có mưa diện rộng, một số nơi đã có mưa to đến rất to (tỉnh Phú Thọ với lượng mưa quan trắc từ 19h ngày 04/10 đến 19h ngày 05/10 tại 2 trạm khí tượng Minh Đài và Phú Thọ đều vượt trên 100mm), mưa to đã gây gián đoạn công tác xuống giống gieo trồng ngô vụ Đông ở nhiều nơi; đồng thời, một số nơi có mưa to đến rất to đã tiếp tục gây ra tình trạng dư thừa ẩm trong đất, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh trưởng của các diện tích ngô đang mọc mầm - cây con và tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loại nấm bệnh gây hại trên cây ngô phát triển, đáng chú ý là bệnh thối rễ, chết cây con.


## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 15-54°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 22-73°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-100°C; riêng một phần nhỏ phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 3-5°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 0-15mm; trong khoảng 04 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 0-8mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại phía Tây của các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 2-13mm; các vùng còn lại có xu thế thấp hơn cùng kỳ có thể lên đến 22mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 16-19mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên

hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-2,2mm; riêng một phần nhỏ phía Bắc của tỉnh Phú Thọ (thuộc phía Đông tỉnh Phú Thọ cũ) có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 0,2mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 26-95%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-67%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn bình thường đến rất ẩm; riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La trong giai đoạn có nguy cơ hạn.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 68-87%.

*Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực*

| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 64,7-83    | 71,0-89,5   | 68,3-86,6  |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 14,9-53,9  | 21,7-73,3   | 36,6-127,2 |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 7,1-8,1    | 9,4-10,8    | 16,4-18,8  |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 0-14,6     | 0,1-7,7     | 0,1-14,7   |
| Cân bằng nước trong đất (%)  | 26,3-95,1  |             |            |

### **3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp**

Dự báo tuần tới, từ ngày 09-10/10, vùng núi có mưa vài nơi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sáng sớm ngày 09/10 vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét. Từ đêm 10/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 12-33°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 0-24mm (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Lúa Mùa trà sớm/chính vụ tập trung trong giai đoạn chín - thu hoạch; lúa Mùa trà muộn trong giai đoạn ngâm sữa - chín sấp. Dự báo tuần tới, trên khu vực có mưa rào vài nơi, riêng khu vực trung du có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to trong khoảng 2 ngày đầu tuần; tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 0-24mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 26-95%. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết tuần tới khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín và xử lý đồng ruộng sau thu hoạch. Do đó, cần tập trung nguồn lực, tiến hành thu hoạch toàn bộ các diện tích lúa Mùa sớm/chính vụ đã chín; sau thu hoạch, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu trừ tối đa các đối tượng sâu bệnh hại trong đất, cây bừa làm đất và chuẩn bị sẵn

sàng xuống giống gieo trồng vụ Đông. Trên những diện tích lúa Mùa trà muộn giai đoạn ngâm sữa - chín sấp; một số địa phương có lượng mưa khá thấp như Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La với cân bằng nước trong đất chỉ dao động từ 26-36%, có nguy cơ thiếu nước, người dân vẫn cần thường xuyên thăm đồng, chủ động tưới thêm nước bổ sung cho lúa nhằm đảm bảo giữ và duy trì mực nước nông trong ruộng khoảng 3cm cho đến khi lúa chín, ngừng tưới khoảng 10 ngày trước khi thu hoạch. Tuần tới, thời tiết trên khu vực chủ đạo lạnh và khô sẽ tạo điều kiện cho chuột cắn phá thời kỳ lúa chín rộ; trên những diện tích lúa còn xanh, cần đề phòng rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn ... tiếp tục gây hại trên những chân ruộng cấy dày, ruộng bón thừa đạm.


Cây ngô vụ Đông trong giai đoạn gieo trồng - cây con - phát triển thân lá. Tuần tới, dự báo trên khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi, riêng khu trung du có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to trong khoảng 2 ngày đầu tuần. Do đó, đối với công tác xuống giống gieo trồng, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xuống giống gieo trồng nhằm đảm bảo việc xuống giống diễn ra thuận lợi và đảm bảo theo đúng với khung lịch thời vụ (riêng những địa phương có mưa to tại khu vực trung du nên hạn chế gieo trồng trong 2 ngày đầu tuần). Đối với các diện tích giai đoạn mới trồng - mọc mầm, cây ngô cần độ ẩm trong đất dao động trong khoảng 65-75%; trong giai đoạn phát triển thân lá, cây ngô cần độ ẩm trong đất dao động trong khoảng 70-80%. Dự báo tuần tới, tổng lượng mưa hữu hiệu trên khu vực dao động trong khoảng 0-15mm, cân bằng nước trong đất dao động từ 26-95%. Tại tỉnh Tuyên Quang, dự báo cân bằng nước trong đất khoảng 69-70%, cơ bản phù hợp cho cây ngô sinh trưởng ở tất cả các thời kỳ. Đối với các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh, phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh, phía Đông Nam của tỉnh Lào Cai, dự báo cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 83-95%, cao hơn so với nhu cầu thực tế của cây ngô, dư thừa ẩm sẽ gây ảnh hưởng đến trực tiếp đến sinh trưởng của cây ngô, đặc biệt là hoạt động hô hấp của bộ rễ trên những diện tích ngô đã mọc mầm/ra rễ; do đó, nên hạn chế xuống giống gieo trồng khi độ ẩm đất còn khá cao (trong trường hợp cần gieo trồng nên ưu tiên trồng bằng bầu) để giảm thiểu thiệt hại; đối với những diện tích ngô đã gieo trồng, cần triển khai công tác xới xáo, làm cỏ để giúp đất thông thoáng khí, giảm độ ẩm trong đất, hạn chế sâu bệnh hại và cỏ dại phát triển cạnh tranh với cây ngô. Đối với tỉnh Thái Nguyên, dự báo cân bằng nước trong đất ở tuần tới khoảng 80%, cơ bản phù hợp cho cây ngô ở thời kỳ phát triển thân lá

sinh trưởng; tuy nhiên, đối với những diện tích ngô mới trồng nên thường xuyên xới xáo để giúp đất khô ráo hơn, tạo điều kiện cho bộ rễ của cây phát triển khỏe mạnh. Các tỉnh còn lại trên khu vực, với cân bằng nước trong đất dự báo dao động từ 26-60%, thấp hơn so với nhu cầu thực tế của cây ngô (đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn với cân bằng nước trong đất chỉ dao động từ 26-36%), cần chủ động tưới thêm nước bổ sung để cây ngô phát triển khỏe mạnh và đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao trên những diện tích mới gieo hạt. Bên cạnh đó, cần chú ý vệ sinh sạch sẽ, cày bừa kỹ, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục/phân hữu cơ vi sinh – phân lân hoặc phân NPK chuyên dành cho bón lót trước khi gieo trồng để tạo nguồn dinh dưỡng ban đầu cho cây ngô; sau khi gieo trồng, cần chú ý trồng dặm bổ sung khi cây ngô có khoảng 2 lá thật nhằm đảm bảo mật độ cây ngô trên ruộng hợp lý. Trong tuần tới, thời tiết trên khu vực thuận lợi cho sâu keo mùa thu, sâu xám gây hại rải rác trên khu vực.

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026**

**Tin phát lúc: 16h45**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**



**Phạm Thị Kim Phụng**