


Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV-41/TN/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY NGUYÊN (CAO NGUYÊN TRUNG BỘ)
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 02 - 08/10/2026)

Trong tuần từ ngày 02 - 08/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 83,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 102,9°C; bốc thoát hơi tiềm năng 21,0mm; lượng mưa hữu hiệu 19,8mm. Tuần qua, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ không khí trong tuần dao động từ 16,1 - 31,1°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 18,2 - 147,9mm.

Tuần qua, từ ngày 02-06/10, mưa lớn đã làm 1,557 ha lúa và 79ha cây trồng khác bị ngập úng tại phía Đông Bắc của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng cũ) (hiện còn ngập khu vực trũng thấp, nước đang rút dần). (Nguồn: Cục Quản lý đê điều, phòng và chống thiên tai)

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02 - 08/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	82,4	83,6	83,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	45,5	57,5	102,9
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,1	11,9	21,0
Mưa hữu hiệu (mm)	8,9	11,0	19,8


Trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), cây cao su trong giai đoạn khai thác mủ. Thời tiết tuần qua khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa đo được tại các trạm cơ bản dao động trong khoảng 18,2 - 147,9mm, cơ bản đã đảm bảo đủ nước cho cây cao su sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, mưa to cũng đã làm ảnh hưởng tiến độ khai thác mủ cao su, và giảm chất lượng mủ. Ngoài ra, mưa to đã gây ngập úng cục bộ tại một số vườn cao su, ảnh hưởng đến sinh trưởng và gia tăng nấm bệnh gây hại trên các vườn cao su. Thời tiết tuần qua mưa ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây cao su như: bệnh như nhện đỏ, nhện vàng và bệnh phấn trắng, vàng rụng lá, khô miệng cao, loét sọc miệng cao.

Cây cà phê trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả -nuôi quả (một số diện tích cà phê vối đã chín bói và một số diện tích cà phê chè ở Lâm Đồng đã cho thu hoạch). Tuần qua, khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, có nơi có mưa vừa- mưa to, có nơi mưa rất to, đã ảnh hưởng đến công tác thu hoạch trên các vườn cà phê đã chín; đồng thời, mưa kéo dài từ những tuần trước đó, tuần qua, khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt 19,8mm, đất trồng luôn trong trạng thái thừa ẩm, dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong đất, mưa to đã làm ngập úng và rụng quả cục bộ tại một số vườn cà phê trên khu vực; đáng chú ý từ ngày 02-06/10, mưa lớn đã làm 79ha cây trồng bị ngập úng (trong đó các diện tích cây cà phê) tại phía Đông Bắc của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng cũ). Thời tiết mưa nhiều cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh gây hại trên cây cà phê như: bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, bọ trĩ, rệp sáp.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 34 - 52°C, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 44 - 68°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,4 - 10°C; riêng phía Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng (hầu hết tỉnh Đắk Nông cũ và phía Tây của tỉnh Lâm Đồng cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 4,4 - 14°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 10 - 14mm, 04 ngày cuối dao động trong khoảng 12 - 13mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3,6 - 18mm; riêng phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 3,2 - 10mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động xung quanh 21mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,08 - 0,5mm; riêng một phần phía Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng (trung tâm phía Nam của Đắk Nông cũ) có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,06 - 0,2mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo dao động trong khoảng 98 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,6 - 15%; riêng một phần trung tâm các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (thuộc phía Đông của các tỉnh Gia Lai cũ và Đắk Lắk cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 1,8 - 6%.

Tính trung bình, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 84 - 95%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	85,0 - 94,7	82,5 - 95,0	83,6 - 94,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	34,2 - 51,5	44,0 - 67,7	78,2 - 119,0
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,9 - 9,1	11,7 - 12,1	20,5 - 21,2
Mưa hữu hiệu (mm)	10,4 - 14,0	11,7 - 13,3	22,1 - 26,5
Cân bằng nước trong đất (%)	97,9 - 100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) từ 09 - 15/10 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 18,2 - 30,7°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 25,0 - 68,9mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), cây cao su tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Dự báo tuần tới, khu vực chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, do đó, người dân cần tranh thủ khai thác mủ vào sáng sớm, khi thời tiết tạnh ráo, tránh ảnh hưởng đến chất lượng mủ bởi mưa. Nhiệt độ thích hợp cho cây cao su sinh trưởng và phát triển từ 20°C đến 32°C (tốt nhất ở 26°C đến 28°C), độ ẩm đất thích hợp trong khoảng 70 - 85%. Dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 18 - 31°C, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động trong khoảng 22 - 27mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 98 - 100%. Qua đó có thể thấy, nhiệt độ không khí về cơ bản thuận lợi cho cây cao su sinh trưởng và phát triển, lượng mưa và cân bằng nước trong đất cao hơn so với độ ẩm đất thích hợp cho cây cao su sinh trưởng, gia tăng nguy cơ ngập úng trên các vườn trồng thấp; do đó, người dân cần lưu ý khơi thông mương rãnh, thoát nước kịp thời khi có mưa to, không để nước đọng ở vườn kéo dài gây ảnh hưởng đến rễ và gia tăng nấm bệnh. Đối với những diện tích đã bị ngập từ tuần trước, cần tích cực thoát nước và theo dõi tình trạng phục hồi của cây, kiểm tra vùng gốc, thân và miệng cạo; hạn chế đi lại, đồng thời phát hiện sớm các biểu hiện vàng lá, suy giảm sinh trưởng, thối rễ và bệnh xì mủ để xử lý kịp thời. Thời tiết tuần tới tiếp tục có mưa, độ ẩm cao, thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh

gây hại trên cao su như: bệnh phấn trắng, bệnh loét sọc miệng cao, bệnh vàng rụng lá, bệnh nấm hồng... cần theo dõi diễn biến của bệnh, hạn chế tối đa tình trạng bị khô miệng cao, chặt bỏ những cành thấp, cành bị bệnh đưa ra khỏi vườn nhằm tránh lây lan diện rộng.

Các diện tích cây cà phê trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả -nuôi quả (một số diện tích cà phê vối đã chín bói và một số diện tích cà phê chè ở Lâm Đồng đã cho thu hoạch). Đối với các diện tích cà phê đã chín bói và cho thu hoạch, cần ra đồng sớm, tập trung thu hoạch, bảo quản cà phê. Nhiệt độ thích hợp cho cà phê sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24 - 25°C, độ ẩm đất thích hợp dao động khoảng 70 - 75%. Khu vực đang trong giai đoạn mùa mưa, dự báo tuần tới khả năng có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và tối), tổng lượng mưa hữu hiệu đạt khoảng 22 - 27mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 98 - 100% cao hơn so với nhu cầu của cây cà phê; do đó, cần tích cực khơi thông mương rãnh, thoát nước kịp thời cho vườn cây, hạn chế tối đa tình trạng đọng nước trong vườn cây (nhất là khu vực gốc) mở đường cho nấm bệnh phát sinh gây hại. Đồng thời, cần lưu ý cắt tỉa cành tạo bộ tán cây thông thoáng, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, cành dự trữ sinh trưởng khỏe, hạn chế nguy cơ sâu bệnh. Bên cạnh tiêu thoát nước cho vườn, tranh thủ trời tạnh ráo, bón phân đầy đủ phân NPK với tỷ lệ phù hợp cho cà phê nuôi quả, ưu tiên tăng cường kali nhằm thúc đẩy quá trình vận chuyển dinh dưỡng vào quả, giúp quả phát triển đồng đều, tăng khối lượng và chất lượng nhân; kết hợp bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh, kẽm, bo... để hạn chế rụng quả sinh lý và nâng cao khả năng chống chịu của cây; cần được chia thành nhiều lần bón trong mùa mưa nhằm nâng cao hiệu quả hấp thu, giảm thất thoát do rửa trôi. Điều kiện thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều trong tuần tới sẽ tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm các đối tượng như: rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân, bọ xít muỗi và các bệnh gỉ sắt, thán thư, nấm hồng, khô cành, thối quả hoặc các bệnh gây hại vùng rễ. Lưu ý tỉa bỏ cành sâu bệnh, cành già cỗi, cành vô hiệu để tạo độ thông thoáng cho tán cây, giảm độ ẩm trong vườn và hạn chế nguồn lây bệnh. Áp dụng các biện pháp

quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên các biện pháp canh tác, sinh học và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu bệnh vượt ngưỡng gây hại, lựa chọn thuốc đặc hiệu, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" nhằm bảo đảm hiệu quả phòng trừ, an toàn cho người sản xuất và bảo vệ môi trường.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Phạm Thị Kim Phụng