



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Số: KNHV-26/TD/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 26/6/2026 đến ngày 02/7/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 19-25/6/2026)

Trong tuần từ ngày 19-25/6/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 77,3%; tích ôn hữu hiệu tuần 145,1°C; bốc thoát hơi tiềm năng 25,2mm; lượng mưa hữu hiệu 12,7mm. Từ ngày 19-22/6, có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; từ ngày 23/6 có mưa rào vài nơi. Ngày nắng và nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 22,0-37,6°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 0,0-75,3mm.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng 26/6 đã gây ngập gần 186 ha lúa và hoa màu (nguồn: Báo Mới).


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 19-25/6/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	81,1	74,4	77,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	59,6	85,5	145,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,9	14,4	25,2
Mưa hữu hiệu (mm)	9,7	2,9	12,7


Lúa Đông Xuân trong giai đoạn chín - thu hoạch; lúa Mùa trong giai đoạn xuống giống gieo mạ - cấy. Trong tuần, từ ngày 19-22/6, khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm); từ khoảng ngày 23/6 đến cuối tuần, trên khu vực có mưa rào vài nơi, với lượng mưa phổ biến ở mức thấp, nhiều nơi không có mưa; ngày nắng và nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các địa phương trên khu vực đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân còn lại, tiến hành cày bừa làm đất và xuống giống gieo cấy lúa Mùa nhằm đảm bảo khung thời vụ. Đáng chú ý, tại tỉnh Cao Bằng từ đêm 25/6 đến sáng 26/6 đã xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất và thiệt hại đến một số diện tích lúa trên khu vực (theo thống kê sơ bộ đến sáng ngày 26/6 đã có khoảng 186 ha lúa và hoa màu bị ngập úng). Trong tuần, sâu bệnh hại trên lúa Đông Xuân có xu thế giảm do phần nhiều các diện tích lúa đã cho thu hoạch; trên lúa vụ Mùa chủ yếu là các đối tượng như ốc bươu vàng, chuột, rầy di trú ...

Tuần qua, các diện tích lạc Đông Xuân trong giai đoạn củ già - thu hoạch. Trong khoảng 4 ngày đầu tuần, trên khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đã giúp cho đất trồng trở nên mềm ẩm và tạo điều kiện cho công tác thu hoạch lạc ở nhiều nơi diễn ra khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong điều kiện đất quá ẩm ướt, một số nơi có mưa to đến rất to, đã gây ngập úng cục bộ và xảy ra tình trạng lạc củ sau thu hoạch bị nảy mầm, thối hỏng. Trong khoảng 3 ngày cuối tuần, lượng mưa trên khu vực giảm mạnh, diện mưa thu hẹp lại, trời tạnh ráo, có nắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác thu hoạch và vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch lạc. Sâu bệnh hại trên cây lạc trong tuần: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá ...


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 26/6/2026 đến ngày 02/7/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 23-61°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 35-83°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, phía Tây Sơn La, phía Tây Bắc Lào Cai, phần nhỏ phía Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang, phần nhỏ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Lạng Sơn và phía Đông tỉnh Cao Bằng có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 6-76°C; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 3-17°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 14-50mm; trong khoảng 04 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 12-36mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu

trên hầu hết khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 4-52mm; riêng tỉnh Quảng Ninh có xu thế thấp hơn cùng kỳ khoảng 17mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 23-26mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, phía Tây Sơn La, phía Tây Bắc Lào Cai, phần nhỏ phía Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-2,1mm; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ có thể lên đến 0,9mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 58-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại tỉnh Sơn La, phần lớn tỉnh Phú Thọ, phần nhỏ phía Đông Nam của tỉnh Điện Biên, phía Tây Nam của tỉnh Lào Cai, một phần phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh (thuộc phía Tây Bắc Giang cũ), phần nhỏ phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn và một phần nhỏ phía Đông Nam của tỉnh Thái Nguyên có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-40%; các vùng còn lại có xu thế tương đương đến cao hơn cùng kỳ có thể lên đến 50%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn ẩm đến rất ẩm; riêng phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) trong giai đoạn bình thường.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 84-93%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	84,7-96,3	83,0-92,5	83,7-93,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	23,2-61,0	34,5-83,3	57,7-144,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,0-11,1	13,4-14,8	23,4-25,9
Mưa hữu hiệu (mm)	13,6-49,9	12,0-36,3	28,1-86,2
Cân bằng nước trong đất (%)	58,2-100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 26-27/6, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng); Từ đêm 27-29/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); Từ 01/7, mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 16-35°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 33-223mm (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Lúa Đông Xuân trong giai đoạn thu hoạch các diện tích còn lại; lúa vụ Mùa trong giai đoạn xuống giống gieo mạ - cấy - bén rễ hồi xanh. Trong tuần tới, từ ngày 26-29/6, khu vực được dự báo có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); từ khoảng ngày 01/7, mưa có xu hướng giảm. Trong điều kiện thời tiết có mưa to, công tác thu hoạch lúa Đông Xuân đã chín và xuống giống gieo cấy lúa vụ Mùa sẽ gặp khó khăn (nhất là thời kỳ 4 ngày đầu tuần). Bên cạnh đó, mưa to sẽ làm cho mực nước trên đồng ruộng và hệ thống kênh thủy lợi dâng cao, gia tăng nguy cơ gây ngập úng; đồng thời, mưa lớn có thể đi kèm dông lốc, sét, gió giật mạnh, có nguy cơ gây đổ ngã cho cây lúa (đặc biệt là các diện tích lúa Đông Xuân). Do đó, ngang những ngày đầu tuần, tranh thủ ban ngày trời tạnh ráo, người dân cần ra đồng sớm, tập trung thu hoạch toàn bộ các diện tích lúa Đông Xuân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Sau thu hoạch, nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, khẩn trương cày lồng vùi rơm rạ kết hợp rắc thêm các chế phẩm vi sinh giúp phân huỷ nhanh rơm rạ nhằm giảm thiểu tình trạng ngộ độc hữu cho cây trồng vụ Mùa. Đối với những diện tích lúa/mạ Mùa chưa xuống giống, cần hạn chế xuống giống trong 4 ngày đầu tuần để tránh thiệt hại do mưa lớn. Đối với những diện tích lúa vụ Mùa, cần khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy và chủ động hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống kênh mương nội đồng trước khi mưa to; sau mưa, cần kịp thời tiêu rút nước, không để ruộng ngập sâu, đảm bảo chỉ giữ và duy trì mực nước trong ruộng trong khoảng 2-3cm đối với lúa mới cấy – bén rễ hồi xanh, đồng thời khẩn trương rà soát những diện tích lúa bị thiệt hại để có kế hoạch dặm bổ sung hoặc cấy lại. Bên cạnh công tác đảm bảo điều tiết nước hợp lý, cần chú ý làm cỏ sục bùn, phá váng vùi phân kết hợp bón thúc để nhánh cho những diện tích lúa Mùa đã bén rễ hồi xanh (lưu ý: không thực hiện bón phân trong khoảng 4 ngày đầu tuần; từ khoảng ngày 01/7, việc bón phân cần hạn chế thực hiện tại những địa phương có khả năng xuất hiện mưa lớn như Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc Phú Thọ ...). Tuần tới, thời tiết trên khu vực có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, sẽ tạo điều kiện cho ốc bươu vàng phát triển và gây hại theo dòng nước; bên cạnh đó, các đối tượng khác như chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng ... khả năng tiếp tục gây hại trên nhiều diện tích lúa Mùa trên khu vực.

Lạc Đông Xuân trong giai đoạn thu hoạch; lạc vụ Mùa trong giai đoạn trong xuống giống gieo trồng. Dự báo tuần tới, từ ngày 26-29/6, khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; từ ngày 01/7, khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, với tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo dao động trong khoảng 28-86mm, cân bằng nước trong đất dao động từ 58-100%. Có thể nhận

thấy, tuần tới khu vực có lượng mưa tương lớn, đất trồng quá ẩm ướt (có thể ngập úng tại những vùng có mưa lớn, vùng trũng thấp ...), nguy cơ thối hỏng/mọc mầm trên những diện tích lạc Đông Xuân và lạc vụ Mùa mới trồng; ngoài ra, mưa to có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, gió giật mạnh gây ngập úng, đổ ngã, thiệt hại trên lạc. Do đó, đối với các diện tích lạc Đông Xuân đã già, tranh thủ những khoảng thời gian trời tạnh ráo trong những ngày đầu tuần, người dân cần tập trung thu hoạch tối đa để hạn chế thiệt hại; sau thu hoạch, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, cày bừa làm đất để kịp xuống giống vụ Mùa. Đối với những diện tích lạc Đông Xuân chưa thể cho thu hoạch, cần chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước khi có mưa to, không để chân ruộng ngập nước sẽ làm tăng nguy cơ thiệt hại. Đối với những diện tích lạc vụ Mùa dự kiến bắt đầu gieo trồng, cần hạn chế xuống giống trong tuần tới, đặc biệt là thời kỳ 4 ngày đầu tuần; trong những ngày còn lại trong tuần khi lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm (từ khoảng ngày 01/7 trở đi), việc xuống giống gieo trồng chỉ nên thực hiện tại tỉnh có độ ẩm đất phù hợp như: Sơn La, phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) và phía Nam của tỉnh Phú Thọ (Hoà Bình cũ), với cân bằng nước chỉ khoảng 58-72%; các địa phương còn lại, với cân bằng nước trong đất dự báo dao động từ 98-100%, cần thực hiện các biện pháp giảm độ ẩm trong đất về ngưỡng phù hợp mới tiến hành gieo trồng để tránh thiệt hại. Trong tuần tới, thời tiết trên khu vực có mưa nhiều sẽ tạo điều kiện cho bệnh thối rễ, thối củ, bệnh mốc vàng phát triển và gây hại trên những diện tích lạc chưa cho thu hoạch.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 03/7/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng