



Số: KNHV-37/CL/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỜI HẠN TUẦN**

(Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 17/09/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) *Diễn biến nhiệt độ tuần qua*

b) Diễn biến lượng mưa tuần qua

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa tuần (từ ngày 04-10/09/2026)

Trong tuần từ ngày 04-10/09/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 82,5%; tích ôn hữu hiệu tuần 137,3°C; lượng bốc thoát hơi tiềm năng 23,5mm; lượng mưa hữu hiệu 29,4mm. Trong tuần qua, thời tiết khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 25,4-34,0°C; tổng lượng mưa ở mức 17,9-55,8mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04-10/09/2026)


Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	80,9	83,7	82,5
Tích ôn hữu hiệu (°C)	59,8	77,4	137,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,1	13,4	23,5
Mưa hữu hiệu (mm)	7,7	21,7	29,4

Lúa vụ Hè tập trung thu hoạch dứt điểm những diện tích còn lại; lúa vụ Thu Đông tiếp tục xuống giống, gieo sạ, chủ yếu trong giai đoạn bén rễ – hồi xanh – đẻ nhánh. Thời tiết khu vực tuần qua có nắng, nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 25–34°C, cơ bản thuận lợi cho công tác thu hoạch và bảo quản lúa Hè Thu. Đồng thời, khu vực tiếp tục có mưa diện rộng, mưa tập trung chiều tối và đêm,


lượng mưa phổ biến từ 18–56 mm, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho lúa vụ Thu Đông sinh trưởng. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá,... tiếp tục phát sinh và gây hại, chủ yếu trên lúa Thu Đông trong tuần qua.

Cây ăn quả tuần qua đang trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch; một số diện tích cây ăn quả trái vụ đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa – ra hoa. Trong tuần, khu vực tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần ở mức 29 mm, cơ bản đã cung cấp lượng nước cần thiết cho cây ăn quả phục hồi sau thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều đã gây ảnh hưởng đến những vườn cây ăn quả trái vụ đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa - xử lý ra hoa, làm hạn chế khả năng phân hóa, phát triển mầm hoa, một số diện tích không thể ra hoa hoặc hoa bị thối, rụng. Điều kiện thời tiết mưa ẩm đã thuận lợi cho nấm, khuẩn phát sinh và gây hại, với các đối tượng bệnh như: bệnh nứt thân xì mũ, thối rễ, thối hoa, thán thư,... tiếp tục xuất hiện trên cây ăn quả trong tuần qua.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 17/09/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 47 - 51°C, tích ôn hữu hiệu dự báo trong 04 ngày sau dao động trong khoảng 67 - 74°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại tất cả các tỉnh trên khu vực có xu thế thấp hơn từ 2-22°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo trong 03 ngày đầu ở mức 10 - 64mm, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 13 - 36mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại rìa phía Đông của các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, hầu hết tỉnh Vĩnh Long, phía Nam của các tỉnh Tây Ninh, tp. Cần Thơ có xu thế thấp hơn, ở mức 15mm; Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế lớn hơn so với cùng kỳ dao động từ 2-70mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 23mm. So với cùng kỳ năm trước, lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết các tỉnh trên khu vực có xu thế thấp hơn, dao động từ 0,12-0,6mm; Chỉ riêng tại phía Tây tỉnh Cà Mau có xu thế cao hơn so với cùng kỳ ở mức 0,04-0,2mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 83 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết tỉnh Đồng Tháp, phía Tây tỉnh Tây Ninh, phía rìa phía Đông Bắc tỉnh An Giang và Vĩnh Long, rìa phía Bắc tp. Cần Thơ có xu thế thấp hơn, dao động từ 3,2-14%; Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế cao hơn so với cùng kỳ ở mức 0,4-4%.

Tính trung bình, hầu hết các tỉnh trên toàn khu vực đang trong giai đoạn bắt đầu ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 88 - 94%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	90,7-96,7	85,5-93,5	87,7-94,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	46,7-50,7	66,6-73,8	113,3-124,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,8-9,9	13,0-13,2	22,8-23,0
Mưa hữu hiệu (mm)	9,8-63,5	13,0-36,2	22,9-92,3
Cân bằng nước trong đất (%)	83,2-100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 11-17/09/2026, khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dự báo dao động trong khoảng 24-29°C, tổng lượng mưa dự báo dao động khoảng 90-270mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Lúa vụ Thu Đông tiếp tục xuống giống, trà chính vụ tập trung chủ yếu ở giai đoạn bén rễ – hồi xanh – đẻ nhánh. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), với tổng lượng mưa tuần dự báo khoảng 90–270mm, do đó, người dân cần ra đồng sớm, tranh thủ ban ngày trời có nắng, triển khai vệ sinh đồng ruộng, làm đất, đảm bảo đủ thời gian cách ly để kịp gieo sạ vụ Thu Đông. Dự báo tuần tới, cân bằng nước trong đất phổ biến ở mức 83–100%, mưa lớn cục bộ có khả năng gây thừa nước và ngập úng tại những vùng trũng thấp, thoát nước kém; do đó, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lớn, gia cố bờ bao, khơi thông hệ thống kênh mương và chuẩn bị phương tiện tiêu thoát nước, kịp thời tháo bớt nước khi có mưa lớn, chỉ duy trì mực nước mặt ruộng khoảng 2–3cm đối với lúa giai đoạn bén rễ – hồi xanh và 3–5cm trong giai đoạn đẻ nhánh; đồng thời, kết hợp bón thúc đẻ nhánh sau gieo sạ khoảng 10–12 ngày, giúp cây lúa sinh trưởng khỏe và nâng cao sức chống chịu với điều kiện bất lợi. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, cần ưu tiên tiêu thoát nước, tránh để ruộng ngập lâu gây thiếu oxy vùng rễ, ảnh hưởng đến khả năng bén rễ và hồi xanh của cây lúa. Đối với diện tích lúa Thu Đông mới xuống giống, trong điều kiện dự báo có mưa vừa đến mưa to, cần chú trọng ngay từ khâu chuẩn bị và

xử lý giống nhằm hỗ trợ quá trình nảy mầm, phát triển rễ mầm và tăng khả năng bám đất, hạn chế hiện tượng trôi giống khi gặp mưa lớn; bên cạnh đó, sau khi gieo sạ cần thường xuyên kiểm tra mặt ruộng, nhất là sau các đợt mưa lớn, kịp thời điều chỉnh mực nước và bổ sung, dặm lại những khu vực có mật độ cây không đồng đều; tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thực hiện các khâu chăm sóc, bón phân và làm cỏ, hạn chế các tác động làm xáo trộn mặt ruộng khi đất còn quá ướt. Điều kiện thời tiết tuần tới mưa nhiều và ẩm độ cao sẽ thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Thu Đông, cần lưu ý sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng,... Đặc biệt, ruộng mới gieo sạ cần chú ý ốc bươu vàng và tình trạng cây con sinh trưởng chậm sau mưa lớn; những ruộng gieo sạ dày, bón thừa đạm và thoát nước kém có nguy cơ phát sinh bệnh đạo ôn cao hơn. Người dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại, chủ động áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp và phòng trừ kịp thời, hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, tránh để sâu bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng.


Cây ăn quả tuần tới tiếp tục trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch; một số diện tích cây ăn quả trái vụ trong giai đoạn phân hóa mầm hoa – ra hoa. Độ ẩm đất thích hợp cho cây ăn quả sinh trưởng tốt trong khoảng 70-80%, đối với diện tích trái vụ trong khoảng 60–70%. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa diện rộng, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to với tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dự báo dao động từ 23–92 mm, cân bằng nước trong đất tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 83–100%; nguy cơ ngập úng, phát sinh và lây lan nấm bệnh trên cây ăn quả là khá cao, vì vậy, người dân cần đảm bảo điều kiện thoát nước tốt cho vườn, khai thông mương, rãnh thoát nước, đào thêm các rãnh phụ sâu khoảng 20–30 cm để nước mưa thoát nhanh; gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm để sẵn sàng bơm nước ra khỏi vườn khi xảy ra mưa lớn. Trường hợp thời tiết mưa dầm kéo dài nhiều ngày, hạn chế đi lại và làm cỏ trong vườn để tránh đất bị bí chặt lại. Ngoài ra, đối với những vườn cây ăn quả bị ngập, sau khi nước rút, mặt đất khô se trở lại, cần tiến hành phá váng, xới xáo nhẹ để tăng độ thông thoáng cho đất; đồng thời, tiến hành cắt tỉa các cành vượt, cành sâu bệnh, cành không có khả năng mang trái nhằm tạo độ thông thoáng cho tán cây và tăng khả năng nhận ánh sáng; đối với các vết cắt lớn cần quét vôi, bôi thuốc trừ nấm hoặc dùng băng keo nilon bịt kín vết cắt, hạn chế nước mưa xâm nhập. Đối với những vườn cây ăn quả nghịch vụ đang trong giai đoạn xử lý khô hạn phân hóa mầm hoa, có thể sử dụng màng nilon làm mái che trên mặt líp trồng cây nhằm hạn chế nước mưa; những vườn đang ra hoa bị

ảnh hưởng bởi mưa lớn, cần tăng cường chăm sóc, có thể phun phân bón lá chứa Bo hoặc các chất điều hòa sinh trưởng phù hợp nhằm hỗ trợ tăng tỷ lệ đậu quả; những vườn đang xử lý ra hoa hoặc đang ra hoa bị ảnh hưởng gần như toàn bộ, hoa bị thối, rụng hoặc không thể ra hoa, cần tiến hành cắt bỏ, tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây để chuẩn bị cho đợt xử lý ra hoa tiếp theo. Thời tiết tuần tới mưa nhiều, độ ẩm cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm, khuẩn phát sinh và gây hại, cần lưu ý các bệnh như thối rễ, thán thư, xì mủ, bệnh loét, thối hoa... Người dân cần thường xuyên thăm vườn, kịp thời phát hiện và xử lý các bộ phận bị bệnh; thu gom và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh để hạn chế nguồn bệnh lây lan, sử dụng thuốc đặc trị để phòng trừ nấm bệnh theo đúng hướng dẫn kỹ thuật. Sau mỗi đợt mưa, có thể dùng nước tưới phun hoặc rung cây để rửa nước mưa, góp phần loại bỏ môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển và làm cho bào tử nấm bám trên lá, cành theo nước rơi xuống đất. Đối với nấm bệnh gây hại rễ, cần quét vôi vùng thân, gốc cây hoặc rải vôi để hạn chế nguồn bệnh.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/09/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng