



Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

Số: KNHV- 37/DN/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 17/09/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 04-10/09/2026)

Trong tuần từ ngày 04-10/09/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 80,8%; tích ôn hữu hiệu tuần đạt 135,4°C; bốc thoát hơi tiềm năng đạt 23,4mm; lượng mưa hữu hiệu đạt 33,6mm. Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 08-10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ không khí dao động từ 23,7-34,8°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 32,9-165,1mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04-10/09/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	79	82,3	80,8
Tích ôn hữu hiệu (°C)	58,9	76,5	135,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10	13,4	23,4
Mưa hữu hiệu (mm)	11,7	21,9	33,6

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây cà phê chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Thời tiết khu vực tuần qua có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động khoảng 33-165mm, đã bổ sung được lượng nước cần thiết cho


cây cà phê sinh trưởng. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây ngập úng tại một số khu vực trũng thấp ven sông, đặc biệt tại các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai và các vùng lân cận. Tình trạng ngập úng làm bộ rễ thiếu oxy, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng, cây vàng lá, rụng quả; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh phát sinh và gây hại. Thời tiết tuần qua mưa nhiều, độ ẩm không khí cao đã tạo môi trường thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh thán thư, bệnh chết nhanh, chết chậm, rệp sáp, bọ xít lười...gây hại cục bộ tại các diện tích trồng cà phê trên khu vực.

Cây sầu riêng trên khu vực Đông Nam Bộ chủ yếu đang trong giai đoạn chăm sóc, phục hồi sau thu hoạch. Tuần qua, khu vực tiếp tục có mưa diện rộng với tổng lượng mưa hữu hiệu đạt khoảng 34mm, đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, bón phân và phục hồi vườn cây sau thu hoạch. Mưa kéo dài trong nhiều tuần qua đã làm gia tăng tình trạng dư thừa nước trong đất; tại một số khu vực trũng thấp, nước từ thượng nguồn dâng cao gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ và khả năng hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tại một số vườn sầu riêng. Tuần qua, mưa nhiều, độ ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên sầu riêng như: bệnh xì mủ gây hại rải rác, nhện đỏ, rầy phấn trắng, thối rễ, thán thư,... gây hại cục bộ trên các vườn sầu riêng trên khu vực.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 17/09/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 47-50°C, 04 ngày cuối dao động khoảng 67-70°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 6-17,5°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 10-27mm, 04 ngày cuối tuần dao động xung quanh 13mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam

Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,2-30mm. Riêng tại một phần phía Bắc TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0-6mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động xung quanh 23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,01-0,4mm. Riêng tại phía Nam TP. Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai cũ) và phía Đông Nam TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,12-0,25mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo lên tới 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết các tỉnh/TP trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,6-3,5%. Riêng tại trung tâm tỉnh Tây Ninh có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,3-6%.

Tính trung bình, trên toàn khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 91-94%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	92,0-96,0	90,0-93,3	90,9-94,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	46,7-49,5	67,4-70,4	114,1-119,9
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,8-9,9	13,1-13,2	23,0-23,1
Mưa hữu hiệu (mm)	9,8-26,7	13,1-13,2	23,0-39,8
Cân bằng nước trong đất (%)	100		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 11-17/09/2026, khu vực Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 24,0-29,0°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 104,1-132,4mm (Nguồn: TT DB KTTV QG).

Trên khu vực Đông Nam Bộ, cây cà phê tiếp tục giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Nhiệt độ thích hợp cho cà phê sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24-25°C, độ ẩm đất thích hợp trong khoảng 70-75%.

Dự báo tuần tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần; gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình đến mạnh, do đó, khu vực tiếp tục có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng mưa hữu hiệu khoảng 23-40mm, cân bằng nước trong đất lên tới 100%, gây dư thừa nước, gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vườn trũng thấp. Bên cạnh đó, lũ trên sông Đồng Nai đang ở mức cao, cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và ngập tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt tại các xã, phường Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Do đó, cần thường xuyên kiểm tra, khơi thông mương rãnh, chủ động tiêu thoát nước cho vườn ngay sau các đợt mưa lớn, không để nước đọng lâu tại vùng gốc, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, thoát nước kém. Đối với những vườn có nguy cơ ngập úng, cần chuẩn bị máy bơm để kịp thời tiêu rút nước; hạn chế đi lại khi đất còn quá ướt nhằm tránh làm đất bị nén chặt, ảnh hưởng đến bộ rễ. Sau khi đất se khô, có thể xới nhẹ lớp đất mặt ở những vị trí bị đóng váng để tăng độ thông thoáng, tạo điều kiện cho rễ phục hồi và hấp thu dinh dưỡng. Trong giai đoạn này, cần bón phân, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đặc biệt chú trọng kali, canxi, magie và bo nhằm hỗ trợ quá trình phát triển quả, hạn chế rụng quả non và nâng cao chất lượng hạt, chú ý không bón phân khi trời mưa to; chia lượng phân thành nhiều lần bón, bón khi đất đủ ẩm và cây đang sinh trưởng ổn định; không bón phân khi đất đang úng hoặc quá ẩm để hạn chế thất thoát dinh dưỡng và tránh gây tổn thương bộ rễ. Những vườn cây sinh trưởng yếu, bộ rễ bị ảnh hưởng do úng nước cần ưu tiên phục hồi bộ rễ trước khi tăng lượng phân bón. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh và gây hại như: rệp, bệnh nấm hồng, bệnh gỉ sắt và một số bệnh do nấm khác. Vì vậy, cần thường xuyên kiểm tra vườn, chú ý các vị trí tán cây rậm, vườn ẩm thấp và những cây sinh trưởng yếu để phát hiện sớm. Khi sâu bệnh xuất hiện, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp, vệ sinh vườn và khoanh vùng xử lý những cây hoặc khu vực bị nhiễm, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết; hạn chế phun thuốc tràn lan toàn vườn nhằm bảo vệ thiên địch, giảm chi phí sản xuất và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.


Cây sầu riêng trên khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục trong giai đoạn chăm sóc, phục hồi sau thu hoạch. Thời kỳ này, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển khoảng 25–32°C, độ ẩm đất thích hợp khoảng 65–75%. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào

chiều và đêm); tổng lượng mưa hữu hiệu đạt khoảng 23-40mm, lượng bốc thoát hơi nước tiềm năng dao động xung quanh 23mm, cân bằng nước trong đất có thể lên tới 100%, cao hơn nhiều so với độ ẩm đất thích hợp cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, mực nước trên các sông, suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức khá cao, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp. Do đó, cần ưu tiên quản lý nước, thường xuyên kiểm tra, khơi thông mương rãnh và chủ động tiêu thoát nước khi có mưa lớn gây ngập úng, không để nước đọng kéo dài quanh vùng gốc nhằm hạn chế tình trạng thiếu oxy bộ rễ và sự phát sinh của các đối tượng gây bệnh. Đồng thời, tranh thủ những ngày tạnh ráo để tiến hành vệ sinh vườn, cắt bỏ cuống quả còn sót, cành khô, cành sâu bệnh, cành vượt và những cành mọc không hợp lý nhằm tạo độ thông thoáng cho tán cây. Kết hợp bổ sung phân bón hợp lý, bổ sung phân hữu cơ hoai mục kết hợp phân NPK có hàm lượng lân phù hợp để phục hồi bộ rễ, thúc đẩy phát triển coi đợt và tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau; thường xuyên theo dõi tình trạng coi đợt để điều chỉnh lượng phân bón phù hợp, giúp cây phục hồi đồng đều và tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm hoa vụ tiếp theo. Thời tiết tuần tới mưa rào, độ ẩm cao thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh, gây hại như: bệnh thối rễ, xì mủ, thán thư, nấm hồng; nhện đỏ, rầy phấn trắng, rệp sáp... Do đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn, đặc biệt tại vùng gốc, thân, cành và những vị trí có khả năng thoát nước kém để phát hiện sớm và áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/09/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng