


Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026


Số: KNHV-37/NT/KSCD

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 04 - 10/9/2026)

Trong tuần từ ngày 04 - 10/9/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 79,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 138,5°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,2mm; tổng lượng mưa hữu hiệu 57,6mm. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to - rất to, nhiệt độ không khí dao động từ 25,1 - 34,7°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 20,0 - 204,1mm.

Tuần qua, mưa lớn vào chiều và đêm 5/9 tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã làm hơn 20ha rau bị thiệt hại nặng (nguồn: Báo quảng Ngãi)

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04 - 10/9/2026)


Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	77,5	80,3	79,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	60,4	78,1	138,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,0	13,3	23,2
Mưa hữu hiệu (mm)	19,2	38,4	57,6

Trên khu vực Nam Trung Bộ, cây lạc vụ Hè Thu đang trong giai đoạn nuôi quả - chắc quả - thu hoạch; lạc vụ Mùa giai đoạn cây con - phát triển thân


lá. Thời tiết tuần qua ngày có nắng, thuận lợi cho công tác thu hoạch và bảo quản các diện tích lạc đã đến kỳ thu hoạch, và thuận lợi cho công tác chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho lạc sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, tuần qua hầu hết các tỉnh trên khu vực đều có mưa, có nơi mưa to - rất to, tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 20,0 - 204,1mm, đã bổ sung lượng nước cần thiết cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, mưa to - rất to đã gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp, khó khăn cho việc thu hoạch và bảo quản các diện tích lạc đã đến kỳ thu hoạch. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho một số sâu bệnh hại lạc như: sâu xám, sâu xanh, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh mốc vàng.

Các diện tích rau màu trên khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu trong các giai đoạn sinh trưởng. Thời tiết tuần qua hầu hết các tỉnh trên khu vực đều có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt 57,6mm đã bổ sung được lượng nước cần thiết cho rau màu sinh trưởng và phát triển, hầu hết các diện tích rau màu sinh trưởng và phát triển bình thường. Tuy nhiên, mưa to - rất to đã gây ngập úng cục bộ, đổ ngã, dập nát một số diện tích rau (chủ yếu rau ăn lá và các diện tích rau trong giai đoạn cây con), cụ thể: đợt mưa lớn vào chiều và đêm 5/9 tại phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã làm hơn 20ha rau bị thiệt hại nặng. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho: bệnh lở cổ rễ, chết éo, thối gốc...phát sinh gây hại gia tăng trên rau giai đoạn cây con; sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, bệnh lở cổ rễ, bệnh sương mai ... gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự; bệnh mốc sương, héo xanh, bệnh héo vàng... gây hại trên cây họ bầu bí.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 48 - 56°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao

động trong khoảng 70 - 83°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3 - 18°C; riêng phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,5 - 7°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 10 - 101mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 5 - 13mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 10,7 - 95mm; riêng hầu hết tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) và phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế thấp hơn hoặc thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước khoảng 0,5 - 25mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 22 - 23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,11 - 0,45mm; riêng từ phía Nam của TP. Đà Nẵng đến phía Đông của tỉnh Gia Lai (tỉnh Quảng Nam cũ đến tỉnh Bình Định cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,06 - 0,4mm.

Cân bằng nước trong đất tuần tới dao động trong khoảng 29 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,1 - 20%; riêng phía Bắc của Tp. Đà Nẵng (Tp. Đà Nẵng cũ), phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đến phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Phú Yên cũ và tỉnh Khánh Hòa cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 1,6 - 16%.

Tính trung bình, toàn khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn rất ẩm; riêng phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) và tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) đang trong giai đoạn bình thường đến có nguy cơ hạn.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 81 - 94%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	84,3 - 97,7	75,5 - 92,0	81,3 - 94,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	47,9 - 56,0	70,0 - 83,1	119,3 - 139,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,5 - 10,0	12,7 - 13,3	22,3 - 23,2
Mưa hữu hiệu (mm)	9,5 - 101,4	4,9 - 13,3	22,3 - 114,2
Cân bằng nước trong đất (%)	28,5 - 100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 11 - 17/9 khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24,9 - 32,4°C, tổng lượng mưa dao động từ 38,1 - 228,3mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Tuần tới, các diện tích lạc vụ Hè Thu tiếp tục trong giai đoạn chắc quả - thu hoạch; lạc vụ Mùa giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Đối với giai đoạn cây con, độ ẩm đồng ruộng thích hợp khoảng 60 - 65%; Giai đoạn chắc quả cần thường xuyên giữ độ ẩm đất ở mức 70 - 75% độ ẩm đồng ruộng. Tuần tới, dự báo khu vực có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, do đó, người dân cần tranh thủ trời tạnh ráo thu hoạch các diện tích lạc Hè Thu đã đến kỳ thu hoạch, tránh ảnh hưởng bởi mưa. Tuần tới dự báo tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng duy trì ở mức 22 - 23mm, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động trong khoảng 22 - 114mm, cân bằng nước trong đất phân hóa rõ rệt dao động trong khoảng 29 - 100%. Trong đó, tại phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) có cân bằng nước trong đất đạt 67% cơ bản thuận lợi cho các diện tích lạc trong giai đoạn cây con sinh trưởng và phát triển; tỉnh Khánh Hòa (bao gồm tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) có cân bằng nước trong đất chỉ ở mức khoảng 30 - 39%, không đủ đảm bảo nước cho cây lạc sinh trưởng trong các giai đoạn của tuần tới, do đó, những nơi có điều kiện tưới nước, người dân cần tiến hành tưới bổ sung nước cho lạc sinh trưởng, có thể tưới theo 2 cách, một là tưới phun đều ruộng lạc, ướm thấm đất; hai là tháo nước đầy vào các rãnh, ngập mặt luống thì tháo nước ra. Các tỉnh/TP còn lại trong khu vực có cân bằng nước trong đất cao hơn so với nhu cầu của cây lạc trong các giai đoạn của tuần tới (cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 91 - 100%), tăng nguy cơ ngập úng khi có mưa to; do đó, tại các tỉnh/TP này, cần chú ý khơi thông mương rãnh, lên luống cao để thoát nước kịp thời khi có mưa to, đặc biệt các vùng trũng thấp, không để ngập úng gây thối rễ, chết cây, và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại; sau khi nước rút cần phá váng để lạc sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Trên toàn khu vực Nam Trung Bộ, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho lạc sinh trưởng và phát triển: bón đạm vô cơ, lân, kali và bón vôi đúng tỉ lệ và kỹ thuật. Thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại trên lạc như: sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, gỉ sắt, bệnh héo xanh vi khuẩn... cần thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu bệnh phải triển khai biện pháp phòng trừ hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng.

Trên khu vực Nam Trung Bộ, các diện tích rau màu chủ yếu trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Độ ẩm đồng ruộng thích hợp cho rau màu sinh trưởng và phát triển trung bình khoảng 70 - 80%. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng ở mức khoảng 22 - 23mm, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động 22 - 114mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 29 - 100% (trong đó phía tỉnh Khánh Hòa và phía Đông của tỉnh Đắk Lắk dao động khoảng 29 - 66%; các phần còn lại dao động trong khoảng 91 - 100%). Qua đó có thể thấy, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có lượng mưa và cân bằng nước dự báo chưa đảm bảo cho rau màu sinh trưởng, do đó, người dân cần tưới bổ sung nước cho rau màu khi trời không mưa, đảm bảo đủ ẩm cho cây sinh trưởng. Các tỉnh còn lại của khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa và cân bằng nước trong đất cao hơn so với độ ẩm đất thích hợp cho rau màu sinh trưởng và phát triển, do đó, cần lưu ý thoát nước nhanh chóng cho rau khi có mưa to, tránh để rau bị ngập úng, sau khi mưa tạnh và mặt đất khô ráo, tiến hành xới xáo phá bỏ lớp váng để đất thoáng, cung cấp oxy cho rễ cây, tăng cường chăm sóc, bấm ngọn để cây ra các nhánh phụ nhằm hạn chế chiều cao tránh đổ ngã, tỉa bỏ các lá bị sâu bệnh, các cành, nhánh vô hiệu gần gốc để tạo độ thông thoáng cho cây, giảm độ ẩm, hạn chế sự phát sinh, phát triển và gây hại của sâu bệnh. Riêng phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của mưa lớn từ tuần trước, những nơi bị ngập lụt người dân cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích rau còn lại và sửa sang lại ruộng để tái canh tác. Thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại trên rau như: bệnh sương mai, giả sương mai, phấn trắng, bệnh héo xanh, bệnh thán thư... phát sinh và gây hại trên cây dưa chuột, ớt, cà chua, bầu bí, su su; trên rau họ hoa thập tự sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, phát sinh và gây hại rải rác; chuột gây hại cục bộ.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng