



Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

Số: KNHV-37/SH/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 04-10/9/2026)

Trong tuần từ ngày 04/9-10/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 74,4%; tích ôn hữu hiệu tuần 142,1°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,4mm; lượng mưa hữu hiệu 14,0mm. Tuần qua, từ ngày 04-08/9 trên khu vực hầu như không mưa, ngày nắng; riêng ngày 08/9 có nắng nóng diện rộng; ngày 09/9 có mưa dông rải rác vào chiều tối, ngày nắng nóng rải rác; ngày 10/9 có mưa dông diện rộng. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 25,5-34,2°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 0,1-113,1mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04/9-10/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	69,9	77,7	74,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	60,7	81,4	142,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,5	12,9	22,4
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0	13,9	14,0


Lúa vụ Mùa phổ biến trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng - trổ bông - chín sữa. Tuần qua, từ ngày 04-08/9 khu vực hầu như không mưa, ngày nắng, riêng ngày 08/9 có nắng nóng diện rộng, cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho các diện tích lúa trổ bông - phơi màu thuận lợi. Ngày 09/9 khu vực có mưa dông rải rác vào chiều tối, ngày 10/9 có mưa dông diện rộng đã bổ sung lượng nước cần thiết cho lúa sinh trưởng. Tuần qua, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, ... tiếp tục là những đối tượng gây hại chính trên các diện tích lúa trong khu vực.

Rau màu trong giai đoạn gieo trồng - phát triển thân lá - thu hoạch. Tuần qua, khu vực duy trì thời tiết nắng ráo (từ ngày 04-08/9), đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tập trung xuống giống, chăm sóc và thu hoạch những các diện tích rau màu trong khu vực. Trong 02 ngày cuối tuần (09-10/9) khu vực có mưa dông diện rộng đã bổ sung lượng nước cần thiết cho rau màu sinh trưởng; tuy nhiên, độ ẩm đất và độ ẩm không khí tăng cao đã tạo môi trường thuận lợi để sâu bệnh phát sinh lây lan. Trong tuần, các đối tượng gây hại đáng chú ý trên rau màu gồm: bọ trĩ, rệp, sâu ăn lá, nhện đỏ, bệnh lở cổ rễ, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh sương mai, ...


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 33-58°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 50-78°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại phía Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ) có xu thế cao hơn cùng kỳ lên đến 5°C; phần còn lại trên khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 7-65°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 2-22mm; tổng lượng mưa hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 11-37mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại một phần nhỏ phía Nam Bắc Ninh (Bắc Ninh cũ), phía Bắc Hải Phòng và phần trung

tâm Hà Nội có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-14mm; phần còn lại trên khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 3-30mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 20-22mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ lên đến 2,1mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 72-99%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại phần phía Tây khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ lên đến 30%; còn lại tại phần phía Đông khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-22%.

Tính trung bình, trên khu vực phổ biến trong giai đoạn ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 73-81%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	69,3-78,0	76,3-83,8	73,4-80,7
Tích ôn hữu hiệu (°C)	33,2-57,6	49,9-78,0	83,1-135,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,5-9,3	11,4-12,5	19,9-21,8
Mưa hữu hiệu (mm)	2,4-21,7	10,7-36,5	13,1-51,5
Cân bằng nước trong đất (%)	72,4-98,5		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, ngày 11/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm ngày 12/9-17/9 có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 18-32°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 13-52mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV QG*).

Lúa vụ Mùa trong giai đoạn làm đòng - trổ bông - chín sữa - chắc xanh. Dự báo tuần tới, ngày 11/9 và, từ khoảng ngày 14/9 khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 13-52mm, cân bằng nước trong đất dự báo phổ biến ở mức khoảng 72-

99%. Nhìn chung, lượng mưa và cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới cơ bản đảm bảo cho lúa sinh trưởng. Riêng tại phía Tây Hưng Yên (Hưng Yên cũ) và Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ), có cân bằng nước trong đất dự báo dao động khoảng từ 72-73%, nguy cơ thiếu nước cho các diện tích lúa đặc biệt trong giai đoạn làm đồng – trở bông; do đó, người dân cần chủ động theo dõi mực nước trong ruộng, tưới bổ sung kịp thời, tránh ruộng khô hạn ảnh hưởng đến quá trình làm đồng - trở bông - vào chắc trên lúa. Đối với các tỉnh còn lại, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên thăm đồng và kiểm tra cao độ mực nước, khơi thông dòng chảy, kịp thời tiêu thoát nước tại những chân ruộng bị dư thừa nước (đáng lưu ý từ khoảng ngày 14/9 khu vực cục bộ có nơi mưa to) chỉ duy trì mực nước trong ruộng từ 5- 7cm trên những diện tích lúa trong giai đoạn làm đồng - trở bông và giữ mực nước nông từ 3-5cm đối với những diện tích lúa đã chuyển sang giai đoạn chín sữa - chắc xanh. Tuần tới, thời tiết mưa nắng đan xen, độ ẩm không khí ở mức cao là điều kiện thuận lợi để rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, ... phát sinh, gây hại.


Rau màu trong giai đoạn xuống giống gieo trồng - phát triển thân lá - thu hoạch. Độ ẩm đất thích hợp cho rau màu sinh trưởng dao động từ 65-80%. Dự báo tuần tới, ngày 11/9 khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm ngày 12/9-17/9 có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 13-52mm, cân bằng nước trong đất dự báo từ 72-99%. Trong tuần tới, đối với các diện tích rau chuẩn bị xuống giống gieo trồng, cần lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp, tránh gieo trồng ngay trước và trong thời gian có mưa to (ngày 11/9 và từ khoảng ngày 14/9) nhằm hạn chế thiệt hại; đối với rau đã đến kỳ thu hoạch, người dân cần tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch triệt để, giảm nguy cơ dập nát, thối hỏng và ảnh hưởng đến chất lượng rau bởi mưa lớn. Tại phía Tây Hưng Yên (Hưng Yên cũ) và Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ), cân bằng nước trong đất dự báo dao động trong khoảng 72-73%, cơ bản đảm bảo nhu cầu về nước cho rau màu sinh trưởng. Đối với các tỉnh/tp còn lại trong khu vực, có cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới tiếp tục ở mức cao (dao động từ 85-99%), gia tăng nguy cơ ngập úng các vườn rau khi có mưa to; do đó, người dân cần chủ động khơi thông rãnh thoát nước, lên luống cao ráo để phòng ngừa ngập úng cục bộ khi có mưa to (từ khoảng ngày 14/9 khu vực dự báo có

mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to). Bên cạnh đó, tranh thủ những ngày trời nắng ráo, người dân cần tiến hành làm cỏ, xới xáo, tía bỏ lá già/ lá sâu bệnh nhằm giúp đất thông thoáng, giảm độ ẩm trong đất về ngưỡng thích hợp cho rau màu sinh trưởng; đồng thời, bón bổ sung phân bón với lượng cân đối và hợp lý (ưu tiên sử dụng phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ) giúp cây phát triển tốt. Tuần tới, điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen, độ ẩm không khí và độ ẩm đất ở mức cao, cần chú ý các đối tượng gây hại có khả năng phát sinh như: bọ trĩ, rệp, sâu ăn lá, sâu tơ, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, thối nhũn vi khuẩn, sương mai, ...gây hại trên rau màu.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng