


Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026


Số: KNHV-37/TN/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TÂY NGUYÊN (CAO NGUYÊN TRUNG BỘ)
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 04 - 10/9/2026)

Trong tuần từ ngày 04 - 10/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 89,4%; tích ôn hữu hiệu tuần 99,5°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,6mm; lượng mưa hữu hiệu 23,5mm. Tuần qua, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ không khí trong tuần dao động từ 17,9 - 29,2°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 51,5 - 208,6mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04 - 10/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	90,2	88,7	89,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	42,2	57,2	99,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,7	12,9	22,6
Mưa hữu hiệu (mm)	9,1	14,5	23,5

Trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), cây ăn quả chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Thời tiết khu vực tuần qua ngày có nắng, thuận lợi cho công tác chăm sóc, bón phân cho các diện tích cây ăn quả phục hồi sau thu hoạch.


Tuy nhiên, khu vực có mưa diện rộng mưa kéo dài nhiều tuần qua, tổng lượng mưa đo được tuần qua dao động trong khoảng 51,5 - 208,6mm, đất trồng dư thừa ẩm đã làm cho một số diện tích vườn cây ăn quả vàng lá, thối rễ, sinh trưởng kém. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả như: bệnh chổi rồng hại nhãn, bệnh thán thư, thối rễ, thối quả,...gây hại rải rác, cục bộ hại nặng tại các vườn cây ăn quả.

Cây cà phê trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) chủ yếu trong giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Tuần qua, khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to - rất to, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt 23,5mm, đồng thời, mưa kéo dài trong nhiều tuần trước đó, lượng nước tích lũy trong đất luôn ở mức cao đã ngập úng cục bộ, gây cành, rụng quả non tại nhiều diện tích cà phê trên khu vực. Thời tiết tuần qua mưa nhiều tiếp tục thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, bọ trĩ, rệp, nhện đỏ.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 4: Bản đồ tổng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 33 - 49°C, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 45 - 68°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế thấp hơn hoặc thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,8 - 17°C; riêng phía Tây của tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (tỉnh Gia Lai cũ và tỉnh Đắk Lắk cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức 4,6 - 10°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 8 - 10mm, 04 ngày cuối dao động trong khoảng 13 - 15mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn hoặc không thay đổi so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0 - 40mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 22 - 23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,07 - 0,45mm; riêng hầu hết phía Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng

(tỉnh Đắk Nông cũ và phía Tây của tỉnh Lâm Đồng cũ) có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,12 - 0,5mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo dao động có thể lên đến 100% trên toàn khu vực. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,9 - 12%; riêng một phần trung tâm của tỉnh Đắk Lắk (thuộc phía Đông của tỉnh Đắk Lắk cũ) có xu thế cao hơn với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 1,8 - 11%.

Tính trung bình, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 88 - 95%.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	88,0 - 94,0	86,5 - 95,3	88,4 - 94,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	33,4 - 49,1	45,0 - 67,7	78,4 - 116,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,5 - 9,8	12,5 - 13,0	22,0 - 22,9
Mưa hữu hiệu (mm)	7,6 - 9,8	12,6 - 14,5	22,0 - 22,9
Cân bằng nước trong đất (%)	99,6 - 100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 11 - 17/9, khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 19,0 - 28,4°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 42,1 - 93,4mm (*Nguồn: TT DB KTTV QG*).

Trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), các diện tích cây ăn quả tập trung trong giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Giai đoạn này cần tiến hành cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát đất tạo độ thoáng cho cây; dọn vệ sinh trong vườn cây ăn quả sau thu hoạch để tránh cư trú của sâu bệnh xâm nhập, gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất, đồng thời, để cây ăn quả nhanh chóng phục hồi, cần bón phân đúng cách, hợp lý, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, trong đó, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ đã được xử lý. Nhiệt độ

thích hợp cho cây ăn quả sinh trưởng trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24 - 30°C; độ ẩm đất thích hợp khoảng 70 - 75%. Dự báo tuần tới khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 22 - 23mm, cân bằng nước trong đất có thể lên đến 100%, cao hơn so với nhu cầu của cây ăn quả trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của tuần tới. Do đó, người dân cần chú ý khơi thông mương rãnh, đào nhiều rãnh phụ sâu khoảng 20-30cm tạo điều kiện cho nước mưa được thoát nhanh; gia cố bờ bao, nạo vét kênh, mương, chuẩn bị máy bơm để rút nước chống ngập úng khi có mưa to - rất to; hạn chế tối đa việc đi lại trong vườn khi đất còn ướt; nếu vườn bị ngập, cần bơm rút nước nhanh cho vườn khi trời tạnh mưa; khi lớp đất mặt bị đóng váng trở nên cứng, cần phá váng dưới tán để không khí và nước thấm xuống đất dễ hơn, cung cấp oxy cho rễ. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, nấm bệnh gây hại trên cây ăn quả gia tăng, nhất là các bệnh do nấm gây bệnh thán thư, thối rễ và thối quả,...người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm bệnh và chủ động các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Các diện tích cây cà phê trên khu vực Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ) tiếp tục giai đoạn phát triển quả - nuôi quả. Nhiệt độ thích hợp cho cà phê sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn này dao động trong khoảng 24 - 25°C, độ ẩm đất thích hợp dao động khoảng 70 - 75%. Dự báo tuần tới, khu vực có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), sẽ cung cấp lượng nước cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển quả. Tuần tới, dự báo lượng bốc thoát hơi tiềm năng ở mức 22 - 23mm, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt khoảng 22 - 23mm, cân bằng nước trong đất có thể lên đến 100%, có nguy cơ gây ngập úng cho vườn trồng thấp khi có mưa to; do đó, cần tích cực khơi thông mương rãnh, thoát nước kịp thời cho vườn cây, hạn chế tối đa tình trạng đọng nước trong vườn cây (nhất là khu vực gốc) mở đường cho nấm bệnh phát sinh gây hại. Đồng thời, cần lưu ý cắt tỉa cành tạo bộ tán cây thông thoáng, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, cành dự trữ sinh trưởng khỏe, hạn chế nguy cơ sâu bệnh. Bên cạnh đó, tranh thủ những ngày tạnh ráo, cần bón đầy đủ phân NPK với tỷ lệ phù hợp cho cà phê nuôi quả, ưu tiên tăng cường kali nhằm thúc đẩy quá trình vận chuyển dinh dưỡng vào quả, giúp quả phát triển đồng đều, tăng khối lượng và chất lượng nhân; kết hợp bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng như canxi, magie, lưu huỳnh, kẽm, bo... để hạn chế rụng

quả sinh lý và nâng cao khả năng chống chịu của cây; cần được chia thành nhiều lần bón trong mùa mưa nhằm nâng cao hiệu quả hấp thu, giảm thất thoát do rửa trôi. Điều kiện thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều trong tuần tới tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại, chú ý: rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân, bọ xít muỗi và các bệnh gỉ sắt, thán thư, nấm hồng, khô cành, thối quả hoặc các bệnh gây hại vùng rễ...Lưu ý tỉa bỏ cành sâu bệnh, cành già cỗi, cành vô hiệu để tạo độ thông thoáng cho tán cây, giảm độ ẩm trong vườn và hạn chế nguồn lây bệnh. Áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên các biện pháp canh tác, sinh học và chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu bệnh vượt ngưỡng gây hại, lựa chọn thuốc đặc hiệu, sử dụng đúng liều lượng, đúng thời điểm và tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" nhằm bảo đảm hiệu quả phòng trừ, an toàn cho người sản xuất và bảo vệ môi trường.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng