


Số: KNHV-37/BT/KSCD


Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 04-10/9/2026)

Trong tuần từ ngày 04-10/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 82,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 133,8°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,9mm; lượng mưa hữu hiệu 49,7mm. Từ ngày 04-09/9, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ ngày 10/9, có mưa trên diện rộng. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 24,5-33,5°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 0,0-95,2mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04-10/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	80,1	83,7	82,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	57,9	76,0	133,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9	13,1	22,9
Mưa hữu hiệu (mm)	25,6	24,1	49,7

Các diện tích lúa Hè Thu - Mùa trong giai đoạn chắc xanh - chín - thu hoạch (các địa phương phía Nam khu vực cơ bản đã thu hoạch xong). Tuần qua, trên khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín; riêng phía Nam khu vực (từ Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa rào rải rác, cục bộ có


mưa vừa đến mưa to trong khoảng từ ngày 04-09/9 đã ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu còn lại tại một số nơi xuất hiện mưa to. Trong ngày cuối tuần, trên khu vực diện rộng đã gây ảnh hưởng đến công tác thu hoạch lúa ở nhiều nơi. Tuần qua, sâu bệnh hại trên lúa có xu thế giảm do phần lớn diện tích lúa đã cho thu hoạch xong.

Tuần qua, các diện tích sản trên khu vực trong giai đoạn phát triển củ. Từ ngày 04-09/9, phía Bắc khu vực (Thanh Hoá đến Hà Tĩnh) phổ biến có mưa rào vài nơi, trời tạnh ráo, có nắng đã tạo điều kiện cho công tác chăm sóc, phục hồi cây sản sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của mưa lớn; phía Nam khu vực (Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đã giúp bổ sung và cải thiện tình trạng thiếu nước tại một số vùng trồng sản. Trong ngày 10/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực có mưa diện rộng, đã làm cho độ ẩm trong đất có xu thế tăng cao, gia tăng nguy cơ gây thối củ và tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loại nấm bệnh hại phát triển, trong đó đáng chú ý là bệnh khảm lá sản do virus.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm tru

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu t




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm tru

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm tr
 Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm tr
 Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 41-58°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 56-82°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-37°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 4-57mm; trong 4 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 13-31mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại phần lớn tỉnh Quảng Trị và phần phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-8mm; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ phổ biến từ 13-47mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 22-23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-0,9mm; riêng phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 0,5mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 95-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất trên toàn khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 4-35%.

Tính trung bình, khu vực đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 79-98%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	74,0-98,0	82,8-98,0	79,0-98,0
Tích ôn hữu hiệu (°C)	40,5-57,5	56,0-82,0	96,5-139,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,2-9,7	12,5-13,1	21,7-22,9
Mưa hữu hiệu (mm)	4,1-56,5	12,5-30,9	22,5-69,4
Cân bằng nước trong đất (%)	94,5-99,9		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 11-12/9, Thanh Hoá và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trong sáng 11/9, sau có mưa rào vài nơi; từ Nam Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 12-15/9, khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 22-33°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 54-297mm. (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Tuần tới, dự báo từ ngày 11-12/9, Thanh Hoá và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trong sáng 11/9, sau có mưa rào vài nơi; từ Nam Nghệ An đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 12-15/9, khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 54-297mm, cân bằng nước trong đất dao động từ 95-100%. Có thể nhận thấy, tuần tới, mưa lớn tập trung chủ yếu trong thời kỳ từ đêm 12-15/9, sẽ gây ngập úng cho nhiều diện tích cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng; cùng với đó, mưa lớn có khả năng kèm theo dông lốc, gió giật mạnh có nguy cơ gây đổ ngã, thiệt hại đến nhiều diện tích lúa trên khu vực. Do đó, người dân cần tiến hành mở toàn bộ đường thoát nước và vận hành hệ thống bơm tiêu úng để giảm bớt lượng nước trên đồng ruộng; từ khoảng ngày 16/9, khi lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm, tranh thủ những khoảng thời gian mưa tạnh, cần khẩn trương huy động toàn bộ nguồn lực tiến hành thu hoạch tối đa các diện tích lúa đã chín (ưu tiên những diện tích lúa đã chín già, những diện tích lúa bị đổ ngã ...). Sau thu hoạch, khẩn trương sấy khô (không để hạt thóc sau thu hoạch bị ẩm quá lâu dễ gây mốc, thối hạt); song song với đó, tiếp tục tiêu thoát nước trên đồng ruộng để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn kèm dông lốc, gió giật mạnh gây đổ ngã. Riêng các địa phương từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An, cần tập trung nguồn lực thu hoạch toàn bộ các diện tích lúa đã chín và khẩn trương phơi sấy thóc sau khi thu hoạch trong ngày 11-12/9; song song với đó, tiếp tục khơi thông mương rãnh và tích cực rút nước trên đồng ruộng và hệ thống kênh mương nội đồng để đón đợt mưa

lớn có khả năng xảy ra từ đêm 12-15/9. Trong tuần tới, tồn tại trên những diện tích lúa chưa cho thu hoạch chủ yếu là các đối tượng rầy nâu, bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn ...gây hại rải rác.

Cây sắn tiếp tục giai đoạn phát triển củ. Ở thời kỳ này, độ ẩm đất thích hợp cho cây sắn dao động từ 60-70%. Tuần tới, trên khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng trong khoảng ngày 12-15/9, với tổng lượng mưa tuần dự báo dao động trong khoảng 54-297mm (trong đó tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 23-69mm), cân bằng nước trong đất dao động từ 95-100%, cao hơn so với nhu cầu thực tế của cây sắn; nguy cơ gây ngập úng, đổ ngã, thối củ ...trên nhiều diện tích sắn khu vực trũng thấp. Do đó, ngay trong ngày đầu tuần tới, người dân ra đồng, kiểm tra hệ thống mương rãnh, mở toàn bộ các đường thoát nước trong ruộng để tránh mưa lớn gây ú đọng nước, ngập úng trong ruộng; ngay sau khi đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 12-15/9 đi qua, cần khẩn trương thăm đồng, tích cực tiêu rút nước tại những chân ruộng đang bị ngập úng, dựng lại những cây sắn bị nghiêng đổ; đến khi bề mặt đất khô se trở lại, triển khai công tác xới xáo nông để phá váng, giảm bớt độ ẩm trong đất và hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ (tránh đi lại, làm cỏ, xới xáo khi đất còn ướt dễ làm bí đất gây nghẹt rễ, đứt rễ, tổn thương củ ...), kết hợp bón phân cân đối (ưu tiên phân bón giàu Kali) để giúp cây sắn nhanh chóng phục hồi và thúc đẩy quá trình vận chuyển và tích lũy vật chất vào củ diễn ra thuận lợi. Tuần tới, chủ động phòng bệnh khảm lá sắn do virus có khả năng tiếp tục phát triển cây sắn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng