


Số: KNHV-38/NT/KSCD


Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 18/9/2026 đến ngày 24/9/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 11 - 17/9/2026)

Trong tuần từ ngày 11 - 17/9/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 82,3%; tích ôn hữu hiệu tuần 132,9°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,8mm; tổng lượng mưa hữu hiệu 52,6mm. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to - rất to, nhiệt độ không khí dao động từ 24,7 - 33,4°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 12,1 - 404,7mm.

Tuần qua, tính đến tính đến 07h00 ngày 17/9/2026, mưa lớn, ngập lụt đã gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp trên khu vực, cụ thể: Đà Nẵng 581ha; Quảng Ngãi 63,2ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại(Nguồn: Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai)

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 11 - 17/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	83,9	81,1	82,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	54,7	78,2	132,9
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,8	13,0	22,8
Mưa hữu hiệu (mm)	45,5	7,1	52,6


Trên khu vực Nam Trung Bộ, lúa Hè Thu trà chính vụ trong giai đoạn chín - thu hoạch; trà muộn giai đoạn chắc xanh - chín; lúa Mùa trà sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ - đòng trổ, trà chính vụ trong giai đoạn chủ yếu mạ - đẻ nhánh. Tuần qua, khu vực có mưa, mưa vừa - mưa to, tổng lượng mưa hữu hiệu đạt 52,6mm, cơ bản đã bổ sung được lượng nước cần thiết cho các diện tích lúa sinh trưởng và phát triển, các diện tích lúa phát triển bình thường. Tuy nhiên, mưa lớn và ngập lụt xảy ra tại Tp. Đà Nẵng (Tp. Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ) và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã gây nhiều thiệt hại cho nhiều diện tích lúa và hoa màu, cụ thể: 581ha tại Đà Nẵng và 63,2ha tại phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tuần qua, một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đen lép thối hạt, bệnh khô vằn,...phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên lúa Hè Thu muộn giai đoạn trổ – chắc xanh, chín; Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, đốm nâu tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa Mùa sớm giai đoạn đòng – trổ. Bọ trĩ, sâu năn, sâu cuốn lá nhỏ,... hại rải rác lúa Mùa chính vụ giai đoạn mạ - đẻ nhánh rộ.

Các diện tích thanh long trên khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Thời tiết tuần qua có nắng thuận lợi cho công tác thu hoạch, bảo quản và vận chuyển các diện tích thanh long đã đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, khu vực cục bộ có mưa to - rất to đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, chất lượng quả thanh long thành phẩm; đồng thời, mưa to đã gây ngập úng cục bộ, một số trụ thanh long bị đổ ngã, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh đốm nâu, bệnh nám cành, bồ hóng, ruồi đục quả,... gây hại rải rác.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 18/9/2026 đến ngày 24/9/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo



Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 52 - 57°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao động trong khoảng 68 - 76°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 3,2 - 14°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 13 - 35mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 12 - 59mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 4,8 - 24mm; riêng phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ) và một phần phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (phía nam của tỉnh tỉnh Phú Yên cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 1,6 - 8mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 22 - 23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,18 - 0,7mm; riêng từ phía Nam của TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi cũ) có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,08 - 0,6mm.

Cân bằng nước trong đất tuần tới dao động trong khoảng 57 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 2,8 - 12%; riêng tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 2,4 - 24%.

Tính trung bình, toàn khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn rất ẩm; riêng tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) đang trong giai đoạn bình thường.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 82 - 94%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	82,7 - 96	82,3 - 93,3	82,4 - 94,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	51,5 - 56,8	67,9 - 75,5	119,4 - 132,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,4 - 9,9	12,4 - 13,1	21,8 - 23,0
Mưa hữu hiệu (mm)	12,7 - 35,0	12,4 - 58,7	25,3 - 90,5
Cân bằng nước trong đất (%)	57,1 - 100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 18 - 24/9 các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (từ TP. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Quảng Ngãi cũ) có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần; từ phía Đông tỉnh Gia Lai đến phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng (từ tỉnh Bình Định cũ đến tỉnh Bình Thuận cũ) có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24,6 - 30,8°C, tổng lượng mưa dao động từ 48,3 - 114,8mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Các diện tích lúa Hè Thu trà chính vụ tập trung thu hoạch toàn bộ những diện tích còn lại, trà muộn giai đoạn chắc xanh - chín - thu hoạch; lúa Mùa trà sớm trong giai đoạn đẻ nhánh rõ - đồng trổ, trà chính vụ giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Do ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt từ tuần trước đó, ngay từ đầu tuần, tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo, các tỉnh/Tp Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung nguồn lực, bơm tiêu thoát nước cho những chân ruộng đang ngập sâu; ngay sau khi nước rút, cần nhanh chóng dọn sạch bùn đất, rác thải trên mặt ruộng, đánh giá tình trạng và kịp thời triển khai các biện pháp chăm sóc phục hồi và phòng chống dịch bệnh sau ngập lụt cho cây lúa. Bên cạnh đó, dự báo đầu tuần tới từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần; từ phía Đông tỉnh Gia Lai đến phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng có mưa rào; do đó, người dân cần tranh thủ thu hoạch triệt để các diện tích lúa Hè Thu trà chính vụ và trà muộn đã đến kỳ thu hoạch (ưu tiên thu hoạch tại các ruộng bị ngập úng, đổ ngã). Tuần tới, tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo trên khu vực dao động khoảng 25 - 91mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 57 - 100%. Trong đó, tại hầu hết các tỉnh trên khu vực có lượng nước tích lũy trong đất khá lớn, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 98 - 100%, có khả năng tiếp tục gây ngập úng, đổ ngã lúa khi có mưa to, do đó, người dân tại những tỉnh này cần theo dõi thời tiết, sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước, chống ngập úng cho lúa khi mưa vừa - mưa to trong khoảng 3 ngày đầu tuần. Riêng tỉnh Khánh Hòa (bao gồm tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) có cân bằng nước trong đất ở mức khoảng 57 - 65%, chưa đủ đảm bảo đủ nước cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, do đó, người dân kiểm tra mực nước trên đồng ruộng, tưới bổ sung nước cho lúa khi mực nước xuống thấp. Trên toàn khu vực Nam Trung Bộ, cần

đảm bảo duy trì mực nước 1-3cm đối với các diện tích lúa giai đoạn mạ-bén rễ; 3-5cm đối với các diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái; khoảng 5-7cm đối với những diện tích đang trong giai đoạn đồng - trổ. Đối với các diện tích lúa đã chín, 10-12 ngày trước khi thu hoạch, cần tháo nước cạn toàn bộ ruộng để giúp lúa chín đều, nền đất cứng để thuận lợi cho công tác thu hoạch và vận chuyển lúa hạt dễ dàng. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ 21/9 đến cuối tuần mưa giảm dần, cần thực hiện bón thúc đồng cho lúa trong giai đoạn đứng cái, phối hợp phân đạm và kali cao, lân thấp; sau khi lúa trổ hoàn toàn có thể bón thúc nuôi hạt với phân NPK chuyên dụng. Thời tiết tuần tới nắng mưa đan xen sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng,.. tiếp tục gây hại trên lúa Mùa trà sớm giai đoạn đứng cái - đồng trổ; sâu đục thân hai chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép thối hạt...tiếp tục gây hại lúa Hè Thu giai đoạn chắc xanh- chín. Ngoài ra, cần chú ý chuột gây hại lúa giai đoạn đồng trổ- chín, Ốc bươu vàng gây hại rải rác trên lúa Mùa giai đoạn sạ - mạ ở các vùng trũng thấp.


Trên khu vực Nam Trung Bộ, các diện tích thanh long chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển dao động trong khoảng 20 – 30°C, độ ẩm đất thích hợp khoảng 60 – 70%. Dự báo tuần tới, các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; từ phía Đông tỉnh Gia Lai đến phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 25 - 91mm, cân bằng nước trong đất tại hầu hết các tỉnh trên khu vực dao động trong khoảng 98 - 100%. Qua đó có thể thấy, tổng lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm so với tuần trước, tuy nhiên, lượng nước tích lũy trong đất khá lớn, cân bằng nước trong đất vẫn ở mức cao, cao hơn so với nhu cầu của cây thanh long, do đó, người dân cần lưu ý hệ thống mương, cống thoát nước, khơi thông rãnh thoát nước, để nước kịp thời thoát nhanh, không để ngập, úng kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của quả, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm ẩm đất cho các vườn thanh long sinh trưởng phát triển. Riêng tỉnh Khánh Hòa cân bằng nước đạt 57 - 65%, cơ bản đảm bảo cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển bình thường. Trên toàn khu vực Nam Trung Bộ, dự báo có mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, người dân cần tranh thủ những lúc tạnh ráo để thu hoạch thanh long. Ngoài ra, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho

cây, phòng trừ cỏ dại để tránh tình trạng thanh long khó hấp thụ được dinh dưỡng từ đất trồng xung quanh. Thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh nám cành, bồ hóng, ruồi đục quả, kiến, đóm nâu.... Đối với những vườn thanh long đã thu hoạch xong, cần tiến hành vệ sinh vườn, tỉa cành, xới đất, bón lót phân hữu cơ để tái tạo đất, tăng độ tơi xốp đất, giúp các vi sinh vật có lợi cho đất phát triển để tăng hiệu suất sử dụng phân NPK sau này và kích hệ rễ cây phát triển mạnh, giúp thanh long khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 25/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng