


Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2026


Số: KNHV-36/NT/KSCD

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 28/8 - 03/9/2026)

Trong tuần từ ngày 28/8 - 03/9/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 71,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 147,5°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,1mm; tổng lượng mưa hữu hiệu 9,0mm. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ không khí dao động từ 25,7 - 36,0°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 0,6 - 32,2mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 28/8 - 03/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	66,7	74,5	71,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	66,1	81,4	147,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9	13,2	23,1
Mưa hữu hiệu (mm)	1,9	7,1	9,0

Trên khu vực Nam Trung Bộ, cây ngô vụ Hè Thu đang trong giai đoạn thâm rêu - thu hoạch; vụ Mùa giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Thời tiết tuần qua khu vực có nắng ráo, thuận lợi cho công tác thu hoạch và chăm sóc các ruộng ngô. Tuy nhiên, tuần qua khu vực có mưa không đáng kể, tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản trên hầu hết khu vực chỉ dao động ở mức


khoảng 0,6 - 13,7mm, bốc thoát hơi nước tiềm năng ở mức cao đạt 23,1mm đã gây khô hạn, thiếu nước cục bộ, một số diện tích cây ngô chậm phát triển (ảnh hưởng chủ yếu đối với các diện tích ngô vụ Mùa). Riêng phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có mưa - mưa vừa, đồng thời lượng nước tích lũy trong đất ở mức cao, vẫn đảm bảo đủ ẩm cho cây ngô sinh trưởng và phát triển bình thường. Thời tiết tuần qua nắng nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: sâu keo mùa thu phát sinh gây hại rải rác, bệnh phấn bố chủ yếu tại Khánh Hòa; Sâu xám, sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh khô vằn,...gây hại cục bộ.

Các diện tích nhỏ trên khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Thời tiết tuần qua ngày có nắng thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích nhỏ đã đến kỳ thu hoạch, và chăm sóc, bón phân cho các diện tích nhỏ sau thu hoạch. Tuy nhiên, tuần qua khu vực tiếp tục có nắng nóng, tổng lượng mưa hữu hiệu chỉ đạt ở mức 9,0mm, đã không đảm bảo đủ nước cho cây nhỏ sinh trưởng và phát triển, đặc biệt các diện tích nhỏ đang trong giai đoạn nuôi quả. Riêng phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng có lượng nước tích lũy trong đất ở mức cao, đồng thời, tuần qua tiếp tục có mưa đã đảm bảo đủ lượng nước cần thiết cho cây nhỏ sinh trưởng. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh phấn trắng, nhện đỏ, bệnh mốc sương, rầy, rệp sáp hại cây.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ
Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 57 - 66°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao

động trong khoảng 73 - 86°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế không thay đổi hoặc cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0 - 13°C; riêng Tp. Đà Nẵng (bao gồm Tp. Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 1,4 - 11°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 9 - 38mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 13 - 87mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 7,3 - 70mm; riêng phía Đông của các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (thuộc tỉnh Bình Định cũ và Phú Yên cũ) và phía Nam của tỉnh Khánh Hòa (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 11,1 - 75mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 23 - 24mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế không thay đổi hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0 - 0,6mm; riêng phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,2 - 0,4mm.

Cân bằng nước trong đất tuần tới dao động trong khoảng 3 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 9,6 - 90%; riêng phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 2 - 5%.

Tính trung bình, toàn khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn bình thường đến có nguy cơ hạn; riêng phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) đang trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 73 - 91%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	70,0 - 89,3	75,8 - 92,8	73,3 - 91,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	57,4 - 65,7	73,1 - 85,7	130,6 - 150,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,8 - 10,2	13,0 - 13,4	22,8 - 23,6
Mưa hữu hiệu (mm)	8,5 - 37,5	13,4 - 86,6	23,5 - 124,1
Cân bằng nước trong đất (%)	2,8 - 99,5		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 04 - 10/9 khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ 05-07/9 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối), khoảng 08-10/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 25,9 - 34,8°C, tổng lượng mưa dao động từ 27,4 - 124,1mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Các diện tích ngô vụ Hè Thu tiếp tục trong giai đoạn thâm rêu - thu hoạch; ngô vụ Mùa giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Dự báo tuần tới, khu vực ngày có nắng, sẽ thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích ngô Hè Thu đã đến kỳ thu hoạch, do đó, người dân cần tranh thủ thu hoạch triệt để các diện tích ngô vụ Hè Thu. Đối với ngô vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con - phát triển thân lá, cần tranh thủ thời tiết nắng ráo, thực hiện kiểm tra và tỉa, dặm cây kịp thời, ưu tiên dặm ở những vị trí cây sinh trưởng yếu, tỉa bỏ những cây mọc đôi, cây còi cọc, dị dạng để đảm bảo mật độ và hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng giữa các cây. Bên cạnh đó, cần tiến hành xới xáo và vun gốc, làm sạch cỏ dại giúp hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng và nước, đồng thời xới xáo giúp đất tơi xốp, tăng khả năng thông thoáng cho bộ rễ; khi cây bước vào thời kỳ phát triển thân lá mạnh, có thể kết hợp vun nhẹ gốc giúp cây đứng vững. Độ ẩm thích hợp cho giai đoạn cây con-phát triển thân lá sinh trưởng khoảng 65 - 85%. Tuần tới, dự báo khu vực có nơi có nắng nóng, lượng bốc thoát hơi tiềm năng duy trì ở mức cao 23 - 24mm; khu vực có mưa rào, từ khoảng 8 - 10/9 cục bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động trong khoảng 14 - 124mm, cân bằng nước trong đất phân hóa rõ rệt tại các tỉnh dao động trong khoảng 3 - 100%. Trong đó, phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có mưa, cân bằng nước trong đất có thể lên đến 100%, cao hơn so với nhu cầu của cây ngô, do đó, cần chủ động tiêu thoát nước cho đồng ruộng khi có mưa lớn, không để ruộng bị ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu dinh dưỡng. Các tỉnh còn lại trên khu vực, dự báo có nắng nóng, cân bằng nước trong đất chỉ đạt khoảng 3 - 53%, chưa đủ đáp ứng nước cho ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần tới, do đó, những nơi có điều kiện tưới nước, người dân cần tiến hành tưới bổ sung nước, đảm bảo đủ ẩm thích hợp cho ngô phát triển; với những khu ruộng có địa hình thấp và bằng phẳng, sử dụng kênh mương dẫn nước vào ruộng; đối với những khu ruộng cao không thể đưa nước vào bằng kênh mương thì có thể dùng hệ thống ống dẫn nước và sử dụng máy bơm nước, cho nước vào rãnh để ngấm dần vào các luống trong một ngày, để qua đêm rồi rút cạn. Trên toàn khu vực, cần chú ý bón thúc cho ngô sinh trưởng, nhất là khi cây có khoảng 3-5 lá, ưu tiên bón cân đối đạm và kali, không nên bón thừa đạm làm cây phát triển quá mạnh, thân yếu, dễ đổ ngã và làm tăng nguy cơ phát sinh một số đối tượng sâu bệnh. Thời tiết tuần tới

tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại cho ngô như: sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn,...người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Trên khu vực Nam Trung Bộ, cây nho chủ yếu trong các giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Độ ẩm đất thích hợp cho cây sinh trưởng trong giai đoạn này khoảng 60 - 70%, nhiệt độ thích hợp trong khoảng 25 - 30°C. Tuần tới, khu vực có mưa rào rải rác, từ khoảng 8 - 10/9 cục bộ có mưa to đến rất to, do đó, người dân cần chú ý tập trung thu hoạch nho vào những ngày đầu tuần khi thời tiết nắng ráo. Tuần tới, dự báo nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 26 - 35°C, bốc thoát hơi nước tiềm năng dao động khoảng 23 - 24mm, tổng lượng mưa hữu hiệu khoảng 24 - 124mm, cân bằng nước trong đất khoảng 3 - 100%. Qua đó có thể thấy, nhiệt độ không khí trên toàn khu vực tuần tới tương đối thích hợp cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Tại phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng, có cân bằng nước trong đất dự báo có thể lên đến 100% cao hơn so với nhu cầu của cây nho, do đó, tại tỉnh này người dân cần chú ý khơi thông mương rãnh, thoát nước kịp thời khi có mưa to, không để nước ngập úng, ứ đọng ở vườn và gốc nho; thực hiện các biện pháp xới xáo giảm độ ẩm đất cho vườn nho. Các tỉnh còn lại của khu vực Nam Trung Bộ, có cân bằng nước trong đất dự báo chỉ ở mức khoảng 3 - 53%, thấp hơn so với lượng nước cần thiết cung cấp cho nho sinh trưởng, do đó, người dân cần chủ động nguồn nước, tưới bổ sung cho vườn nho, đảm bảo duy trì đủ độ ẩm đất thích hợp 60 - 70%, cho cây sinh trưởng, chu kỳ 5 -7 ngày tưới 1 lần cho nho nuôi quả. Trên toàn khu vực Nam Trung Bộ cần lưu ý bón phân đầy đủ cho các vườn nho theo nguyên tắc 4 đúng: đúng loại, đúng liều, đúng lúc và đúng cách. Đối với vườn nho đã thu hoạch xong, cần xới đất, tỉa cành, bón phân, chăm sóc để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây phục hồi. Thời tiết tuần tới tạo điều kiện cho bọ trĩ, rầy ăn lá, rệp sáp hại cây, bệnh phấn trắng, nhện đỏ, bệnh mốc sương, bệnh thán thư...phát triển gây hại, người dân cần thường xuyên thăm vườn, phòng trừ kịp thời khi có dấu hiệu của bệnh, hạn chế tối đa tình trạng lây lan trên diện rộng.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 11/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng