



Số: KNHV-36/TD/KSCD

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 28/8-03/9/2026)

Trong tuần từ ngày 28/8-03/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trên khu vực 73,0%; tích ôn hữu hiệu tuần 137,2°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,7mm; lượng mưa hữu hiệu 10,7mm. Tuần qua, từ ngày 28-31/8, khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 01/9, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 20,6-37,1°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 2,0-87,7mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 28/8-03/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	83,0	65,4	73,0
Tích ôn hữu hiệu (°C)	57,4	79,8	137,2
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,0	12,6	22,7
Mưa hữu hiệu (mm)	8,7	2,0	10,7

Lúa vụ Mùa trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đồng - trở bông. Tuần qua, từ ngày 28-31/8, trên khu vực có mưa rào rải rác với lượng mưa phổ biến ở

mức thấp, mưa to chỉ xảy ra vài nơi; từ khoảng ngày 01/9 đến cuối tuần, khu vực gần như không mưa, trời tạnh ráo, có nắng, có nơi có nắng nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện tiêu rút nước cho đồng ruộng và chăm sóc phục hồi cho các ruộng lúa bị ngập úng trước đó. Trong tuần, sâu bệnh hại trên cây lúa chủ yếu là các đối tượng như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn ...

Cây chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Thời tiết tuần qua với khoảng 4 ngày đầu tuần tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, độ ẩm trong đất và trong không khí ở mức cao, đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây chè (đặc biệt là hoạt động của bộ rễ) và tạo điều kiện cho một số đối tượng như rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi ... phát triển gây hại. Trong khoảng 3 ngày cuối tuần, khu vực gần như không có mưa đã tạo điều kiện cho công tác thu hái và chăm sóc các diện tích chè sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra khá thuận lợi.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) *Tông lượng bốc thoát hơi tiềm năng*




b) *Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước*

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) *Cân bằng nước trong đất*



b) *Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước*

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 26-62°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 30-79°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 3-95°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 1-19mm; trong khoảng 04 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 9-35mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên hầu hết khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 2-36mm; riêng phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai và phía Đông của tỉnh Lai Châu có xu thế thấp hơn cùng kỳ có thể lên đến 14mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 20-23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-2,3mm; riêng phía Bắc của tỉnh Phú Thọ, một phần nhỏ phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang và phần nhỏ phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Ninh có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 0,1-0,5mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 80-100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại các tỉnh Lào Cai, phía Bắc của các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Đông của tỉnh Lạng

Sơn, phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Ninh có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-8%; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-30%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 78-88%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	73,3-87,0	80,5-91,5	78,1-88,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	25,6-62,0	30,0-78,9	55,6-140,9
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,6-9,7	11,6-13,1	20,3-22,7
Mưa hữu hiệu (mm)	1,0-19,1	9,3-35,4	18,3-38,2
Cân bằng nước trong đất (%)	79,6-99,5		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 04-10/9, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 04/9 có nắng nóng diện rộng. Khoảng ngày 08-09/9 có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 15-33°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 18-55mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Tuần tới, dự báo trên khu vực duy trì thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng ngày 08-09/9 có mưa rào rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng ngày 04/9 có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ trung bình ngày (ngoại trừ tỉnh Lào Cai được dự báo có mưa nhiệt độ trung bình ngày chỉ khoảng 17°C không thuận lợi cho lúa Mùa trổ bông) phổ biến dao động 20-29°C sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các diện tích lúa Mùa trên khu vực sinh trưởng và phát triển (đặc biệt là những diện tích lúa Mùa trổ bông). Tuy nhiên, cũng do thời tiết ít mưa (đặc biệt là những ngày đầu tuần) với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 18-55mm, đồng thời, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất tuần có thể lên đến 33°C, nên lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần tới dự báo ở mức khá cao (dao động từ 20-23mm), cân bằng nước trong đất có xu thế giảm (trên toàn khu vực dao động trong khoảng 80-100%), một số nơi có thể xảy ra tình trạng thiếu nước (phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh với lượng mưa dự báo trong tuần tới chỉ khoảng 18mm),

do đó, cần chủ động kiểm tra cao độ mực nước trong ruộng, kịp thời tưới bổ sung khu vực nước xuống thấp, đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng từ 5-7cm nhằm đảm bảo cho quá trình làm đòng - trổ bông diễn ra thuận lợi. Bên cạnh công tác đảm bảo nhu cầu về nước cho cây lúa, cần kết hợp bón thúc đón đòng cho những diện tích lúa đã chuyển sang giai đoạn đứng cái nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho quá trình làm đòng diễn ra thuận lợi. Tuần tới, chú ý theo dõi sát diễn biến của một số đối tượng sâu bệnh hại có khả năng gây hại gia tăng trên cây lúa trong điều kiện thời tiết nắng - mưa đan xen như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu - rầy lưng trắng, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, bệnh thối nhũn ... để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.


Cây chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Tuần tới, dự báo khu vực có mưa rào vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 08-09/9 khu vực có mưa rào rải rác; ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, riêng ngày 04/9 nắng nóng diện rộng. Do đó, người dân nên triển khai trong khoảng 4 ngày đầu tuần và trong ngày cuối tuần để đảm bảo chất lượng búp chè thành phẩm, lưu ý việc thu hái trong những ngày này cần thực hiện vào sáng sớm hoặc chiều mát, không hái chè vào giữa trưa nắng gắt dễ làm khô búp và sụt giảm chất lượng chè. Đối với sinh trưởng của cây chè, trong các giai đoạn này, độ ẩm đất thích hợp cho cây chè dao động trong khoảng 75-80%. Tuần tới, mặc dù dự báo lượng mưa không quá nhiều (tổng lượng mưa hữu hiệu chỉ dao động từ 18-38mm), tuy nhiên, từ nhiều tuần trở lại trên khu vực liên tục có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng nước tích lũy trong đất khá cao; trên hầu hết khu vực được dự báo cân bằng nước trong đất vẫn ở mức cao hơn so với nhu cầu thực tế của cây chè (dao động từ 85-100%) sẽ gây nghẹt rễ/thối rễ, giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ đó làm sụt giảm chất lượng và sản lượng búp chè khi thu hoạch. Do đó, trong tuần tới người dân cần chú ý, tiếp tục khơi thông mương/rãnh thoát nước và tiến hành thoát nước trên đồi chè sau khi có mưa, không để nước ứ đọng xung quanh gốc kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ thối rễ; tranh thủ những ngày tạnh ráo, triển khai công tác xới xáo phá váng, cắt tỉa cành, làm cỏ và vệ sinh sạch sẽ tàn dư thực vật dưới gốc nhằm giúp tán và bề mặt đất thoáng khí, giúp giảm bớt độ ẩm trong đất và hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ (lưu ý việc cắt tỉa cành nên tránh triển khai trong ngày đầu tuần khi có nắng nóng diện rộng để tránh gây ra hiện tượng khô đầu cành, cây bị suy kiệt sau cắt tỉa; trong những ngày còn lại trong tuần, nên ưu tiên cắt tỉa vào sáng sớm hoặc chiều mát). Riêng phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh với

cân bằng nước trong đất dự báo khoảng 80%, cơ bản phù hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, sau mỗi lứa hái chè từ 5-7 ngày, khi cây chè bắt đầu ra lứa búp non mới, cần chú ý bón bổ sung thêm phân bón với hàm lượng Kali cao kết hợp phun thêm phân bón lá chứa chất trung vi lượng/axit amin để giúp cây chè dưỡng búp. Đồng thời, trong điều kiện thời tiết có mưa vài nơi, có nơi có nắng nóng, độ ẩm đất và không khí ở mức cao, các đối tượng như bệnh phòng lá, thối búp, đốm nâu, đốm xám, rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ ... sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển gây hại; cần chú ý khi mức độ gây hại của các đối tượng còn nhẹ, cần khẩn trương hái toàn bộ những diện tích chè bị hại để tiêu hủy, trong trường hợp mức độ gây hại vượt ngưỡng cho phép cần ưu tiên sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học để phun diệt trừ (lưu ý cần đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo đủ thời gian cách ly trước khi thu hái).

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 11/9/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng